

PARA

PHRASIS, IN NONVM LIBRUM

brum Rhazæ Medici Arabis clariss. ad

Regem Almanforem, de singularū

corporis partium affectuum

curatione, autore An-

drea wesalio Bru-

xellensi Medi-

cine candi-


dato.

IOH. MAVRITIUS.

Ex officina Rutgeri Resch.

Mense Februar.

1537.



ORNATISS.

VIRO D. NICOLAO FLORENTI,
inuietissimo Caroli Caesaris Medico peritissimo.
Andreas Vesalius Bruxellensis. S.

Recte nimirum veteres non parum interestesse iudicarunt, vir doctissimus, qua quis ratione in artibus ac scientiis versaretur, hoc est, exactane in illis seruaret methodum, & a primis ad secunda, ac sic deinceps ad proxime semper consequentia debito transiret ordine, an vero prout vnusquodque se casu obtulisset, ita vel primum, vel secundum ab eo haberetur. Quod cum tu minime ignorares, meque aliquot ab hinc annis, Medicinæ studio operam daturum intelligeres, operæ pretium fore duxisti, præclarissimam quandam longæque utilissimam studendi in arte Hippocratica mihi præscribere rationem, cui quidem summa, qua potui, diligentia semper insistens, mihi dictu, quanto meo comodo, nullisque adeo ambagibus, ad eam tandem peruenerim Medicinæ partem quæ curatiua dicta cæteris.

A. ii. cum

PRAEFATIO

cum ob hanc & illæ discantur, tum præstā-
tior est, tum ad vsum longe etiam accommo-
datior. Atq; hic adeo multum mirari coepi
communem nostri temporis plurimorum
Medicorum in abigendis morbis rationē,
tantum a Græcorum, doctissimorūq; hoīm
modo euariatā, ac barbarorū, Arabūq; per-
petuo (prope dixerim) vestigijs tam perti-
naciter inherentem. Vnde nec abs re fore
dixi, ne quid illorum omnino nos fugiat,
vna cum Græcis (quos tuo exquisitissimo
iudicio semper præferre consueuisti) Arabes
quoq; hac in parte paulo diligentius confer-
re. Hanc etiam rationem excellētissimi Pa-
risienses medici suis tyronibus plurimum
commendarunt, sic fore sperantes, vt pro-
pediem, vetus illa, & ab Hippocrate autore
perfecta ἱατρικὴ, magna cum mortalium vti-
litate, prorsus reuocata, passim vigeat, sum-
pto paulatim artem hanc exercitantium ope-
ra, incremento. Cum igitur sic tuo & meo-
rum clarissimorum præceptorum consilio
obsequutus, Rhazen ex alijs primum in ma-
nus sumpsissem, ac maiori cū studio ad Græ-
corum

corum scripta, tanquam ad lapidem Lidiū,
 examinasset (eum namq; inter reliquos sue
 gentis in curandī artificio primas tenere, a
 praeceptore meo D. Iacobo Syluio eruditiss.
 sane Medicę artis professore subinde audie
 ram) ita profecto placuit, vt dignum cense
 rem, qui sordibus ereptus, & elegantiori la
 tini sermonis cultu circundatus, a delicatio
 ris quoq; auris lectore reciperetur, maxime
 quod omnes fere locales morbos in tam exi
 guo opusculo persecutus sit, quodq; non nisi
 in paucissimis a Gręcorum decretis declina
 rit, vt hinc etiam quidam adstruere sint co
 nati nonum hūc Rhazæ librum e Græca in
 Arabicam conuersum linguam, ac sic dein
 cept Rhazæ nomen illi præfixum. Sed ma
 nifeste reclamare videntur, tum incognita
 Græcis medicamina, tum ipse dictionis sty
 lus & character, adeo horridus & incultus,
 quemadmodum est Arabum vniuersus, vt
 nihil omnino cum Gręcorum illi concinni
 tate & elegantia conueniat, nec perinde fa
 cile, aut in Græcum, aut in Latinum sermo
 nem transfundi se sinat. Atq; hæc cogitanti
 mihi,

P R A E F A T I O.

mihi, sapi⁹ in diuerſa diſtractus eſt anim⁹,
 nunc quidem ad hoc vrgens, vt quod æquū
 iudicaſſem, id ipſum aggrederer, nunc vero
 rei difficultate perpensa, ab hoc ipſo rursus
 deterrens. Nam præter ea quæ dicta etiam
 nunc ſunt, nonne vel moleſtiſſimum eſt, tot
 medicaminū, aliarumq; vocū interpretatio-
 nem, ad ſuſceptum negotium omnino neces-
 ſariā addiſcere? Siquidē pauca admodum in
 eius libri tranſlatiōe remedia inuenias, quæ
 non vel vitiate ſcripta, vel obſcuris quibus-
 dam, aut etiā Arabicis dictionibus appella-
 ta ſint. Sed vicit tandem publica vtilitas,
 priuato commodo (ſi modo laborum fuga cō-
 modum dici mereatur) longe ſemper anteſe-
 renda. Neq; vero parum ſubſidiū polliceri vi-
 debantur, qui difficillimæ ſimplicium me-
 dicamentorum ſcientiæ inſtaurationi incu-
 buerunt, quod ferme duodecim iam annos
 feliciffima quæq; Medicorum ingenia, nec
 inſœliciter tentarunt, vt perrarus admodū
 alienius nominis Medicus extiterit, qui
 non aliquid poſteris, quod ad hanc ſcienti-
 am pertineret, relinquere ſit conatus. Huc
 enim

enim omnes tam nobis exoptatis sudoribus
contendebant, ut videlicet pharmacopolarum
officinas barbaris vocibus, ne dicam falsis phar-
macis infertas, pristinae integritati restitue-
rent. His igitur motus causis, atque horum
adeo exemplo Rhazae versionem castigare ag-
gressus sum, ut & immenso labore ceteros
Medicinae candidatos liberarem, & ipse post
hac autor ad hominum manus emendatior p-
ueniret, repurgatis non solum medicamentorum
barbaris, latinisque auribus incognitis voci-
bus, sed tota etiam orationis serie in melius
commutata, ut quae prius squalida & inculta
essent, nec propter obscuritatem percipi possent,
nunc quatenus fieri possit, & res ipsa ferat,
splendeant, minusque adeo lectori negotium ex-
hibeant. Verum nec hic quidem (quod forte
ab interprete desideraretur) verbum semper
verbo reddere conatus sum, imo potius pa-
raphrastem egi, libere, quae ad rem necessa-
ria iudicaui, subinde adiiciens, & quaedam
fussiore, quae nimirum obscuriora visa sunt,
oratione explicans. Vnde etiam vereor nostras
lucubratiunculas a quorundam vitiligina-
torum

PRAEFATIO.

eorum moribus tutas minime futuras, ut
 qui nihil a sua horrida barbarie emutatum
 enouatumque velint, nec quicquam, quod ipsi
 non didicerint pensi habeant, repertis enim
 frugibus, glandem defendunt, nec cum Gryl-
 lo in hominem redire volunt, ne aliquando
 fastuosa illorum inscitia vulgo turpiter in-
 notescat. Quocirca vir praestantissime, pri-
 mum hunc iuvenilem conatum, tua nominis
 celebritate commendatum, æditionis aleam
 subire volui, utpote melius, ita a calumnijs
 tutum fore sperans. Siquidem tuam singu-
 larem in Græcorum & Arabum scriptorū
 Medicinæ cognitionem, & raram ac inau-
 ditam philosophicarum rerum scientiam, re-
 liquasque præclaras animi tui dotes, tales
 alienæ virtutis olores reueriti, pristinae Hip-
 pocraticæ artis studiosorum conatibus, male
 obloqui ac detrahare desinent. Tibi autem eū
 debeo, quod summus ad Medicinam, & ad
 alias meliores disciplinas, mihi autor ex-
 stiteris, nec adhuc cesses, subinde me doctis-
 simis tuis literis ad ea studia incitare, tuoque
 patrocinio (quo vbiq̃ plurimū vales) a
pud ali

PRAEFATIO.

pud alios prouehere. Rogo itaq; vt hoc me-
 orum studiorum preludium, hilari atq; ex-
 porrecta fronte, cōtra istos male feriatos de-
 fendendum suscipias, ac per ocium quid in
 eo praestiterim videas, donec maiora & tuæ
 excellēti doctrinæ digniora parauero. Vale
 vir literarissime, et nro Impatori Augustis.
 Carolo, quo hoc praesenti tēpore carere orbis
 Christian⁹ nō potest, diu foelicitatēq; viuito.
 Bruxellis Cal. Feb. An. M. D. XXXVII.

¶ Iodocus Velsius Hagiensis.

Noſtros docta iuuant, placuerunt barbara quōdam,
 Hoc Arabum dictat puluerulenta cohors.
 Inter quos topici Rhaſes medicaminis autor
 Emicat, excellens utilitate ſua.
 Sed male quod uerſus, patria cū gēte legatur,
 Diſplicet, at poſthac gratior extiterit.
 Quod tibi Weſali merito tribuiſſe queamus,
 Laus te certa manet, tu modo perge, ſequor.

PARA
PHRASIS, IN NONVMLI,
brum Rhazæ Medici Arabis clariss. ad
Regem Almanforem, de singularū
corporis partium affectuum;
curatione, autore An-
drea Wesalio Bru-
xellensi Medi-
cine candi,
dato.

¶ De capitis dolore.
Caput, i.

Ex fan-
guine.

Q Vando capitis ardori eiusdem ten-
sio & gravitas, oculorumq; ac faciei
rubor affuerint, & reliquum corpus tactu
calidum, pulsusq; magnus precipue in tem-
poribus sentiatur, humeralis vena partis do-
lentis, aut eius, quam potissimum dolor ex-
ercet, secanda est. Deinde aqua rosacea vna
cum aceto ac oleo rosaceo sumenda, quæ sis-
mul tamdiu, donec debitam crassitiem reci-
piane,

plant, agitentur, dein niue, aut fonte refrige-
rata, capiti ab alto sunt infundenda. Aeger
autem a carniū esu & vino arcebitur, cæ-
terum lentes cum posca & croco decoctas,
aut lenticulam solam aqua incoctam, & ole-
ra frigida, uel elixa, vel cruda, & infrigidan-
tes fructus, edat. Alium porro ex myroba-
lanis citrinis, prunis, tamarindis & sacca-
ro albiſſ. ducere expedit. Verum si hæc in-
efficacia ſint, althææ ſemen aceto infuſum,
donec iuſtam viſcoſitatem obtineat, piſtil-
lo contundito, ac in emplaſtri formam ca-
piti applicato. Quineriam ex herbæ pulica-
riſ ſemine aceto macerato, vtiliter catapla-
ſma capiti induces. Si iam comprehenſis
notis pulſus veloces adſint, tactuq; ingens
percipiatur calor, nullo tamen rubore faci-
es, aut oculi ſuffundantur, neque vlla no-
tabili tenſione laborent, ſtatim inter ini-
tia ventrem medicaminibus bilem flauam
purgantibus ſoluere, deinde commemora-
tis localibus præſidijs vti, conſiliū eſt. Ve-
rū naribus oleū violarū, aut cucurbitę dome-
ſticę, aut nymphęę, aut florū ſalicū infundeſ,
& ha

Ob bills
copiam.

PARA. IN NONVM

& horum oleorum singula per se niue refrigerata, ab alto capiti instillabunt, et zger paulo ante commemorata victus ratione cibabitur. Odorabit vero camphoram, aquam rosaceam, salices, violas, & quæ his refrigerandi facultate respondent. Quod si post horum usum morbus plurimum inualuerit increueritque, sumito opij & camphoræ singulorum pondus duorum granorum hordei, ac oleo salicula uigata, auribus & naribus immittito.

pituita.

Porro si graui capitis dolori nihil eorum, quæ de ruboris suffusione dixi in facie, aut oculis conspiciatur, morbusque in vetustatem protractus fuerit, inter initia leuioribus purgantibus auxilijs tentatis, venter catapotijs coccij a grani (quod Græci κοκκιοι appellat) magnitudine sic vocatis, ducendus est. Quorum compositionem ipse in hunc modum institui. Pulueris picræ drachmæ decem, cucurbitæ syluestris drachmæ tres cum scrupulo, scammonij drachmæ duæ cum semisse, Iturbis, stichados singulorum drachmæ quicque, rediguntur hæc in catapotia, quæ decem distinctis vicibus in robustissimis corporibus

Nim 2.
ithymali
pēs.

por

portiguntur, cæteris autem pro virium ratione. ¶ Quoniam autem præsens compositio, propositi noni libri commentatoribus inspecta est, existimantibus interpretem loco duorum scrupulorum cum semisse scammonij, vertisse drachmas duas & semissem, huius loco Galeni compositionem catapotiorum ex aloë, interscribendam putavi. Habet autem ea libro primo secundum locos in hunc modum. Cucurbitæ sylvestris pars vna, aloes & scammonij, singulorum duæ. His ego, scribit Galenus, absinthij succi partem vnā admisceo, antea vero mastichen quoque chiā, et bdelliū indidī. Sic etiam Quintus utebatur, Galenus & Alexander cotoneorum succo hæc excipiunt, Paulus aqua, Oribasius brassicæ succo. Ac quia huiusmodi catapotia instar grani ciceris finguntur, a multis coccia quoque appellata sunt. Dantur Galeno & Paulo vndecim, Alexandro quindecim. ¶ Post deiectam autem aluum, capiti oleū sambuci & glandis vnguentarię infundendum, idem auribus quoque & naribus immittendū est. Ad hæc egro oderis gratia confectio

Alia tamen
Me. & Ni.

II. galliæ

PARA. IN NONVM.

¶ Passilli
sunt ex o
siente ad
nos adue
sti.

¶ Veteri
bus inco
gnitam

lib. 1. ad

gno

¶ galliæ moschata appellata, naribus obij
cienda, & moschus narium foraminib⁹ in
spirandus est. Caterum si malum multum
incrudescat, molestetq³, sumito euphorbii et
castorei vtriusque sesquibulum, & in ole
sambuci momento solutum, naribus & au
ribus instillato. In vehemētis capitis dolo
re, qui cum æstu est, emplastrum infra scri
ptū, capiti & fronti utiliter applicabis. Em
plastrum ad ingentē capitis seruidū crucia
tum. Accipito lactucarū semen, glaucii præ
parati succum, & lignum quod sandalum ap
pellamus, & rubrum, & album, nocē Indis
cam, rosas, opii momentum, his aceto & ro
sacearum aqua conspersis, ac maceratis, inso
mato emplastrū, & fronti superinducito, de
inceps illi conduplicatā fasciā, aceto & rosa
cea aqua imbutā, superponito, eaq³ exiccata
rursus aliam huiuscemodi refrigerātī liquo
ri intinctam, illigato. Linimentū discu
tiens & digerens, ad dolorem qui cū frigore
est, efficax. Castorei, euphorbii, piperis, sina
pis, styracis, rutæ, marubii singulorū equæ
portiones, hæc exiccata, & in puluerē sub
acta.

RHAAZAE DE MOR. CVR .ss.

acta, & per cribrum secreta cōmisceto, atq;
illis vino veteri conspersis, informato pastil-
los ad solem exiccandos, ac quādo vsus po-
stulauerit, vno illorum vino veteri, aut oleo
costino chamemelinoue detrito, frōtē et tē-
pora idētidē ilinito. Vel vnū ī minori liquo-
ris portione dissolue, ac instar emplastri frō-
ti subinde inducito. Hoc enim linimētum,
seu emplastrum, cōi vetusto capitis dolori est
q̃ accommodatissimum, nō modo fronti ac
temporibus admotum, sed etiam in aurem
quoq; inditū, praesertim si in aliquo iā com-
prehensorum oleorum dissolutus pastillus
fuerit. Aegrotanti vero vinum vehemēs ac
vetus, circa mali declinationē, non tamen af-
fatim praebeto. Ceterum quando ingens ca-
pitis dolor, septimanam totam perdurans,
hominem affligit, in laconicum primā bal-
nei domum, aut balnea aquarum medica-
mentosarum exiccandi vi praeditarum, a-
ger deducendus est, ac capiti infundenda a-
qua, in qua chamemelum, & sampsuchus, &
stichas Arabica seu Gallica, & serpillum,
simul omnia, aut singula per se ebullierint.

Porro

*vinum in
ob-
sa cau*

Ob vetricu
i vitiu.

Porro si caput indies ante cibum indo-
luerit, ac post ingestes cibos conualuerit,
laboranti, ante tempus, quo corripit consue-
uit, succurrendum est, exhibendo panis offu-
las, succo mali punici, aut immaturæ vuę,
aut alijs virtute his paribus, immerfas.

Ex isolatu.

Si dolor capitis eb diutinam in sole mor-
iā, concitatus fuerit, huic facile aceto & ro-
faceo bene refrigeratis, subuenire poteris. ac
si dolor his nō remittitur, alijs intensius re-
frigerantibus propellendus est. Quod si
præterea ingens capitis dolor perseverat,
ac intenditur, neq; ullis præsidijs cedit, sitq;
metus a grum visu priuatum iri ob fluxum
humorum in oculos, arteriæ, quæ per tempo-
ra repunt, opportune iuciduntur, ac manuali
arte laqueis interseptæ, euelluntur. Verum
postremum illud præter præsentis libri in-
stitutum, hoc in loco tractatur.

in fine .13.
methodi &
pud Paulū
6. ca. 4.

De uertigine quam Græci ἐκτόνομα vocant.

Caput .ii.

A sangui-
nis copia.

Cum alicui ea quæ foris sunt, in gyrum
circumagi videntur, & oculi tenebris
obru-

obruuntur, & concidere æger vult, quumq;
eodem tempore, quo scilicet malo egrotus
tenetur, facies & oculi rubore suffuli sūt, ac
venæ post aures reptantes sanguine turgide
cernuntur; eas tum incidere cucurbitulasq;
collo & tibijs agglutinare expedit. Cæterū
si hæ venæ inconspicue lateāt, faciesque ru-
bore suffundatur, ex axillari sanguis minu-
endus, & cucurbitule tibijs affigendę sunt.

Galēn.
arterias
tersecat.

In vtriusque autem his vertiginis speciebus
iam cōmemoratis, ad repellendum humorū
affluxum, capiti rosaceum cum aceto est in-
fundendū. Ventrem vero myrobalanorum
citrinarum decocto, superius ad capitis do-
lorem inscripto, deñcere vtile est. Porro
quum neque faciei oculorumque rubor, neq;
febris, vertiginosis adsunt, perpendendum
est, an ne oris vētriculi eversio, an nausea ho-
minem infestet. Quę si ægrotanti affuerit,
primū vomitum leniter irritato, deinde quā-
titatem corcījs catapotijs præcedenti capite
descriptam præbeto, & a frigidioribus ac
pituītam coaceruantibus cibis ægrotantem
arceto. Verū si neq; oris vētriculi subuer-

Ob. s. 8.
machiv-
tium.

Ex pro-
pria cere-
bri pitui-
ta.

PARA. IN NONNUM

lio, neque cibi fastidium adsint, nullæq; calor
loris notæ appareant, aluum subinde cata
potijs coccijs soluito. Cibos ad hæc frigidos
omnino egrū auersari iubeto, & gargariza
tionē, quæ eliciēde pituitę sit, preparato. Na
ribus itē portionem aliquam inscribendo
rum ad attonitum morbū, vt struthij pulue
rē inspirato, quo caput & calefacias, & ster
nutationes irites. Nec inutiliter quoque
ad eundum vsum, caput excalefacientibus
vntionibus vteris,

¶ De phrenitide.

Caput. iii.

Paulo &
Alex. acu
ta habet.

Q Vando febris & continens homoto
nos ægrum iuuat, vna cum vehe
menti capitis & oculorum grauitate, præte
rea si multus rubor faciei & oculorū, & dor
lor distendens capitis, & horror quidam lu
cis, pulsusque solito velocior ac frequentior
adsuerint, phrenitidis future certissima in
dicia adesse iudicabuntur. Si autem ad hæc
lingua aspera & nigra, vel suppalida fiat,
perturbeturq; adeo intellectus, vt æger mē
te alienetur & deliret, multisq; vigilijs ex
crucietur, phrenitis perfecta putabitur. Ae

gro

gro itaque priusq; enarrata illa symptomata
 ta omnia concurrant, venæ sectione, ac ven-
 tris solutione, ex fructuum videlicet myro-
 balanorum, tamarindorum & prunorum
 succo succurrendum est. Alimento autem
 eius, sit aqua cum hordeo elixa, eaque semel,
 aut bis in die propinata, pro consuetudine,
quam dum sanus esset, habuit. Capiti quidem
 acetum cum rosaceo ab alto, ad compescen-
 dum humorum impetum, infundatur. Cete-
 rum si ægrotantem crebræ vigiliæ vrgent,
 sumito violarum exiccatarum, corticum pa-
 paueris albi, hordei corticibus liberi, semi-
 nis lactucarum, radicum mandragoræ, sin-
 gulorum tantum quantum manu vna ap-
 prehendere potes, & simul in ænea olla quā
 aqua impleueris, tantisper dum aqua rube-
 scat, decoquito. Deinde aquam iam tepidam
 capiti instillato, & sit caput ad peluim, in
 quam aqua recipiatur, inclinatum. Item
 deinceps huiusmodi decoctum, in æneo va-
 se ad ignem modice recalesactum capiti su-
 perfundito. Hoc sane singulis diebus crebro
 factum, magnum leuamentum egro adfert.

B it Caput

Ve plasi
 mū ex sa
 gui. in teg
 nui men
 ge.

pro co
 me
 Band

balnea
 capite

P A R A. I N N O N V M

Caput præterea oleo violaceo muliebri lacte contemperato, irrigandum, quo etiam lana mollis imbuta, capiti applicanda est.

Rō mittē
di sanguī
nis.

Porro si ægri vires inter morbi initia valide constantesque esse conspiciantur, sanguis protinus e cubito mitti debet, & is copiosior. At si manum desipiens non porrigat, metusque sit secundum vacuationē sanguinis profluuij, recta in fronte vena diuisa, vna vice quod satis est auferemus. Si vero vires languide dissolutæque sint, aliam curandi rationē, qua morbum depellamus, aggrediemur.

*a fronte
phlebotomia*

¶ De apoplexia. Cap. iiii.

SI aliquis ueluti sopore oppressus decumbit, & sine somno naturali stertit, cumque pungitur non sentit, certum est eum apoplexia teneri. Est sane huius morbi magnitudo estimanda, secundum quod fortiter, aut debiliter stertit et respirat eger. Quum itaque illi ob summam spirandi difficultatem, spuma ab ore prorumpit, nullis remedijs ipsi subueniri potest. Verum si leniter stertit, et liberius eger respirat, morbus lenior mitior.

oro.

ordē existit. Presens quidē affectus, aut mox
opressum iugulat perimitq̃, aut solutus, in
neruorum resolutionem desinit. Quo circa

A sangui-
nis copia

his symptomatibus agrotantem affligenti-
bus, considerandum est, an ægri facies mul-
tum, aut cruenta, aut liuida, aut subuiridis
fieri incipiat, vti euenire solet, sanguine in mē-
bro aliquo vinculis, aut quavis constrictiōe
retento. Siquidem tunc sanguinem ilico ex
duabus venis iugularibus, aut duabus hu-
meralibus incisis, minuere opportunum est.

Porro si ad hunc modum res se non ha-
beat, sed dum æger aërem inspirat, auditur
in thoracis, & asperæ arteriæ capacitate aë-

A pituita
so humo-
re.

ris sonitus & murmur, tum hic clyster vti-

liter ei infundetur. Accipit autem, cucurbi-
tæ sylvestris, cyclaminis, centaurij minoris,

Aeris in-
fusio.

alterius cyclaminis speciei, hellebori albi si-

gulorum tantum quantum manu vna com-

prehendere potes, omniaq̃ simul tribus libris

aquæ, ad duarum consumptionem decoquū-

tur, deinde per colum transfunduntur, atque

ex huius decocti semilibra, clyster in anum

indigur, qui si cito ab ano elapsus fuerit, rur-

sua

PARA. IN NONVM.

sus repetit⁹, ac donec humorum copia vna
 cum eclystere deniciatur, infunditur. Nari-
 bus adhæc struthium, & veratrum albū de-
 critum, leni spiritu crebrius inspiretur. Est
 præterea ore per vim aperto conandum, vt a-
 nacardinam confectionem cum mulla, per
 os ad ventriculum subinde agrum degluti-
 re procuremus, atq; eius negotij singulis di-
 ebus sollicitudo habenda est. Medicamenti
 autem pondus erit sesquidrachma potui ob-
 lata. descriptio vero eius medicaminis capi-
 te de nervorum resolutione habetur. Fris-
 xorium quoque ferreum candens, capiti
identidem tam prope admoendum, vt ca-
pilli etiam ægroti aduri videantur. Cæterū
 si his rationibus affectus non discutitur, in
 medicādo maiorem operam nauabimus. et
 enim caput rademus, & sinapi trito, & ca-
 storeo acetosq; acerrimo, oblinemus. In
 priori quidem propositi affectus specie, post
 detractum sanguinem fortiter brachia in-
 tercipere iurat, inijciendo scilicet vincula
 brachiorum parti, qua cum scoptulis illis
 articulatio est, similiter & tibiæ partes

graciliores vinciri ex vsu est. Quinetiam ad reprimendum sanguinis affluxum, qui huius affectus autor esse consuevit, caput rosaceo oleo & aceto ex vino preparato, perfundere prestat. Preterea venam, ad sanguinis reuulsionem, in pedibus secare, deinde diruendi gratia, eam quæ in narium extremo apparet, incidere conducit.

¶ De † lethargo .Cap. v.

SI quis cum profunda animi in somnū delatione iacet, & tamen si vrgeatur sentit & mouetur, verum oculos semper occlusos habet, quos tamen si altius ille inclamatur, aperit, atq; ilico sopore oppressus occludit, is lethargo phrenitidi contrario vitio laborat. Quem affectum clysteribus acerbis, supra capite de apoplexia descriptis, curare profuerit. Ori quoq; laborantis mulsaq; infundenda, quam ut per fauces dimittat, sollicitare oportet. Siquidem ea ægro alimentum loco præbetur. Caput ad hæc tribus primis diebus, aceto cum rosaceo irrigabitur. Verū post tertium diē sternutationes, struthi et veratri albi puluere inspirato irritabimur.

† Alij sua
beth, alij
sopore in
terptantur.

Paul. &
Alex. in
lethar. se
cāt uenā

Caput

PARA. IN NONVM

Caput quoque non inutiliter rademus, & si
napi cum aceto & castoreo perfricabimus.
Caro autem cum fere eandem ipse cum le-
thargo causam nanciscitur, eadem præsidia
accommodare expediet.

Ex pitu.
cerebrū
ībuente.

¶ De congelatis, quibus semper oculi in-
conniuentes manent. Cap. vi.

Ob refri-
geratū cor-
poris ha-
bi.ū.

Congelatum ac rigidum merito aliquē
iudicabimus, quum quasi in somnum
solutus decumbit, nec ab assidentibus inci-
tatus mouetur, & licet oculi patent, cilia ta-
men eius immota ac rigida permanēt. Sub-
ueniendū vero huic malo medicamentis le-
thargo, & graui somno dicatis. At præter
illa, oleum sambuceum capiti infundatur,
in cuius singulis libris, vncia euphorbi ad-
iecta sit. Præterea caput ipsum ex castoreo
& euphorbio in oleo sambuceo læuigatis,
illīnatur.

A pī. anis
malis fa-
cultatis
ducto oco
cupāte.

¶ De nervorum resolutione, quæ παρά-
λυσις dicitur. Cap. vii.

Quoniam aliquis ad motum omnino
impotēs est, ita ut vnum, aut plures
artus

artus commouere minie queat, siq; vna ipso
 rum sensus abolitus fuerit, illum resolutione
 vnus, pluriumue artuum tentari pronuncia
 mus. Huius quidem malí curationem cata
 potiorum foetidorum a me compositorum
 oblatione, auspicabimur. Ea accipiunt pulue
 ris hierę picrę drachmas decē, syluestris cu
 curbitę carnis interioris drachmas quinq;
 euphorbii drachmas duas cum semisse, casto
 rei, piperis, succi Cyrenaici, sagapeni, opopa
 naxis, & thapsiæ Indicę, sinapis singulorum
 drachmam vnā, centaurii minoris, succi cu
 cumeris agrestis vtriusq; drachmas quinq;
 gummi rutę succo diluitur, quo alia excepta
 in catapotia digeruntur, quę decem dosib;
 exhibenda sunt. Quorum vna portione de
 uorata & triduum a medicaminum vsu æger
 conquiescet, ac eo tempore cicerum deco
 cto, & oleo, & sinapi enutrietur. Postea alte
 ram dosim assumat, huic vbi tertia succeffe
 rit, aliquantulo temporis interuallo ad vires
 recolligendas, a medicamentorum vsu æger
 abstineat. Cibi conueniunt speciebus cali
 dis, & incidētibus seminibus cōditi ac pre
 para

NB:

Parali
sia;

supra
sup 18:

Seitaras
gi Mar. i
ter. lepidi
on.

& Aliqui
3. hebdo
mada s
scribi vo
lunt.

20

PARA. IN NONVM.

parati, cuius notæ est piper, & huic caliditate paria, & caro minutim concisa, & in frixorio frixa, vel alioqui alij ad cōcoctiōem expediti, nec recrementicij. Potius autem mulsæ sit. Iam membra quoq; resoluta, oleo continuo vtiliter inunguntur. Quod recipit, costæ vnciam vnā, piperis, pyrethri, euphorbij, singulorum tertiam vnius vnciæ partē, castorei semunciam, oia in semilibra ꝓ olei violæ luteæ, quæ antiquis parietibus increscit, aut olei narcissi læuigant, atq; ita mēbris deficientibus inuncta, multū iuuant. Porro diebus singulis, quibus a catapotiorū supra descriptōrū vsu, æger liber est, exhibendæ sunt drachmæ duæ subsequētis confectiōis, quā ab anacardi cuiusdā arboris Indiæ fructu, anacardinā appellāt. Zingiberis, pyrethri, nigellæ, piperis nigri, piperis lōgi, seminis petroselinī Macedonici singulorū drachmæ viginti, myrrhæ, rutæ siccæ, liquoris Cyrenæici, aristolochiæ, baccarū lauri, castorei, thapsiæ Indicæ, sinapis, gētianæ, singulorū drach. v. anacardorū in aqua maçeratorū cremoris, q̃ ob polentem dulcedinē, mel anacardinum dicunt

Al. cher
ua, j. ricini
iraticis.

dicatur, drachmas. v. irrorentur omnia oleo
 nucū, & melle decocto ac despumato excipi
 antur. Medicamē hoc neruorum resolutiōi,
 apoplexiæ, oris contorsioni, tremori, alphis
 tum albis, tum nigris, scorpionum ictibus,
 conuulsioni, quæ humiditati fertur accepta,
 & in summa, omnibus frigidis affectibus,
 q̄ maxime accommodum censetur. Siquidē
 hoc medicamento genus, statim atq; duorū
 denariorum quantitate deuoratum est, sudo
 res elicit, febrimq; sua mirifica calefaciendi
 potentia, ægro conciliat. Verū si forte pro
 pinatum, egrotantē sanitati non restituerit,
 ab oī medicamine ipsum abstinere, ex usu e
 rit, interim tñ victus ratione (quæ cū studio
 adhiberi debet) exacte instituta. Deinde rur
 sus viribus recollectis, ad mali curationem
 properabimus. Ceterū si resolutio ex pla
 ga, aut casu ab alto, aut incidente quopiā cor
 pore, subito facta sit, oī curationis spe adem
 pta, affectus (utpote neruo, aut musculo, aut
 tendōe per trāsuersum disrupto) incurabilis
 pmanebit. Si vero nō subito malum ex his
 causis excitatum sit, sed processu temporis

Ab exte
 nacā.

parale
 lura

legitur nō sēp̄ uer paula

P A R A. I N N O N V M

paulatim & pedetentim augeatur, tum loco læso emplastrum hoc adhibeatur, quod recipit, farinā scenogræci, glandē vnguentariā, nucleos ceraforū syluestriū, & domesticorū, semen ricini fruticis, bdellium, ammoniacum, adipem anatis, ceram, oleum lilij, & simul omnia contusa & commista, in formam emplastri rediguntur, quod læsæ parti inducitur.

¶ De stupore ac tremore. Cap. viii.

Stupor, a
frigido
succo.

SI quis aliquod suorum membrorum ita affectum sentit, vt sæpe pedes nostri afficiuntur dum obstupescunt, partem eam stupore implicitam affirmamus. Quoniam aut dispositio hæc si longius prorogatur, in resolutionem transit, eius curationem haud differem⁹. Subueniē itaq; huic malo, plurimū, remedijs, & victus ratione nervorum resolutioni dicatis, priuatim vero costini olei inunctione. Verum si affectus inueterauerit, æger catapotijs foetidis purgabitur, & eius intemperies anacardini confectionis vsu, rationeq; victus calidiore & sicciore, ad temperiem

periem reducetur. Ceterum tremori eius-
 de præsidijis, quibus stupori succurris, sub-
 ueniendum est. At si ex liberaliori vini usu
 obortus is sit, æger sibi a vino temperabit.
 Similiter si ex aque & niue solutæ potu, in
 hunc affectum inciderit, ab ea quoque abstine-
 bit, ac in laconicum primam balnei domum
 valde calefactam, quousque sudor copiosus eru-
 pat, properabit, aut balneis aquarum naturalium
opportune utetur, atque crebro in sole uti-
liter apricabitur.

Tremor
 ab eadem
 causa mi-
 nori

¶ De oris distortionem Cap. ix.

ORis conuulsione aliquem affligi testa-
 mur, si quando illi os ad alterum latus
 contorquetur, & oculum ad quem illud con-
 uellitur, occludere nequit, præterea si expira-
 re iussus, flat⁹ ab altera tantum parte prorumpat
 effleturque. Curationem vero eius alui deie-
 ctione per catapotiorum foetidorum propina-
 tionem, aggrediemur, & cibum ægrotanti,
 & potum incidentem, ac calefacientem, ut capite
 de nexuorum resolutione persecuti sumus,
 instituemus. Item indies mane priusquam
 cibum

Ob pituitam
 infarcionem

PARA. IN NON VM

cibum æger capiat, ex sinapi & ſyrupo acetoſo, gargarizationē porrigemus. Et in tenebroſam domū deducto ægro, iubebimus, vt nucē myriſticam partē ea qua affectus eſt, ore retineat. Narib⁹ etiam ad irritandas ſternutationes, ſtruthium detritū inſpirabim⁹. Præterea oleo coſtino egri cervice vertebras & faciē, & frontē pungemus. Adhæc ſingulis dieb⁹ anacardini cōfectiōis ſeſquidrachmā, nō inutiliter æger aſſumet. Quod ſi hiſ re medijs affectus nō cedit, ventris ſolutionē, ac plane eandem, cū iam comprehenſa, curationē repetemus. De ea porro oris cōuulſione, quę nō ſubito, ſed paulatī oritur, hæud quāq̃ mihi ſermo eſt, ſiquidē huiuſcemodi nō niſi in pernicioſa phrenitide, aliſq̃ morbis acutis, morte iā imminēte, inuadit ægro tantē, atq̃ tūc ea ex ſiccitate originē ducit.

¶ De cōuulſione; quam σπασμὸν
Græci vocant. Cap. x.

C Vm cuiſiam particula aliqua contra-
cta ad ſuā cōuellitūr originē, ſiue quā
plures ex inſtrumentariis partibus ita affici
untur, cōuulſas eas eſſe iudicamus. Cōuul
ſio au

uſio
lagna
uſio

Nō autem omnis, aut statim, aut pedetentim
 apprehendit. Conuulsioni quidē subito exo-
 rienti, eadem curandi ratio, quam resolutiōi
 ex usu esse praecepimus, adaptanda est. Pri-
 uatim tamen in hac, partim plurib⁹ manuū
 frictionibus, partim frequentiori olei costi-
 ni inunctione utimur. Quae vero non repen-
 te inuadit, sed lente aridam & stuantemque
 febrem, aut largas deiectiones, aut copiosum
 vomitum, aut ingens sanguinis profluiū,
 allamue magnam inanitiōem, aut ariditatē,
 subsequitur, mala est, atq; ad curandū contu-
 max conuulsio. Nihilominus qualiscūq; sit
 morb⁹, eius tñ curam aggrediemur, ac egro
 hordei decoctū, & iuscula pingua, emollien-
 tiaq; & frumentaceas sorbitiunculas admi-
 nistrabimus. Ac deinceps in aquae tepentis
 solium, & grotantem deducemus, & egelido
 oleo violaceo, & oleo ex semine cucurbitę do-
 mesticę, neruorū maxime exortus conuulsi-
 one implicitos, inungemus. Præterea ut so-
 lio diutius immoret, oleoq; violaceo illinat,
 hortabimur, ac vinū modicum perq; aquo-
 sū bibat, cibisq; humidioribus sese enutriat.

Exreph
 tione

Exvacu
 itate

PARA. IN NONVM

De morbo commitiali επιληψία
dicto. Caput. xi.

Percōsor
tium ali
cuiuspar
ticulæ.

MOrbo sacro commitialiue quempiam
detentum testamur, quum in terram
subito cōcidit, ac quasi concussus cōuellitur,
sed ita vt principis aīæ facultatis noxa cōco
mitet. Qd' si cū his idicīs oris spuma, pecu
liaris admodū huius malī notā, apparet, aut
vrina & stercus præter voluntatē excernun
tur, aut genitura prflouit, dispositio deterior
vehementiorque existimatur. Perro si & ger
priusquam malo corripatur, præsentiit qua
si auram seu spiritum ex particula quāpiam
sursum ferri, ac caput petere, vnde postea vi
ribus dissolutus cōcidat, necessū erit, simul
atque auram hanc subnasci sentiat, antequā
in terram collapsus conuellatur, vt eam par
tē a qua aura effertur, superius fortiter vin
culis intercipiat ac constringat, siquidem eo
pactō, reuertī accessionem prohibere consue
uimus. Conualescente itaque ab accessioni
bus ægro, viribusque recreatis, purgatione
ex catapotīs coccīs sollicitandus est, & pars
contagionem impartiens, sinapi, pipere, eu
phor

phorbio ac melle anacardino inungēda, tan-
 tis per dūm pustulæ oboriantur, & tenui sa-
 nie plenę crepent, ac liquor in illis collectus
 profluat. Nec cicatrice obducātur, donec qd-
 quid in illis coaceruatum sit, pro maneat; nā
 hec huius affect⁹ certissima curatio est. Po-
 stremo etiam cucurbitulę cum modica cutis
 incisione, parti consortij lege affectum infe-
 renti affigantur. Si autem æger priusq̃
 morboseum inuadat, nauseam, vel vētriculi
 erosionem, palpitatiōemq̃ patiatur, & dein
 accessio subsequatur, sæpe vomitū porrectis
 his, quę vomitibus ciendis sunt idonea, iri-
 tabimus, quo facto, vt medicamen amarum
 in potu frequenter sumat, hortabimur. Ven-
 triculo quoq̃ emplastrum ex spica, rosis ru-
 bris, mastiche & thuris cortice, vino odora-
 to subactis, imponendum. Vniuersa autem
 vict⁹ ratio, agro talis præscribi debet, quæ
 sit quamminime excrementitia; qualis est
 tum caro in frixorio frixa; & X profundio-
 ribus vasis incocta, tum auis palatum den-
 tatum habēs, Arabibus; taguid appellata,
 tum aliarum auium in collibus degentium

Ex stōm-
 chi vitio

X Manag. v
 tratis habet
 Pli. li. 10. c.
 44. diome
 deas huius
 generis auē
 uocare vidē-
 tur.

P. A. R. A. I. N. N. O. N. N. V. M.

Ex cerebri
pituita.

& hœdorum caro. Porro si ægro sensuum obfuscatio motricisque facultatis imbecillitas ac torpor superuenerint, nullaq; cōmemorata indicia adfuerint, laboranti catapotia coccia subinde sunt offerēda. Et cibos quoque incidentes ac extenuantes, e quorū numero antē dicti sunt, præbere competit. Gargarizatio ad hæc, vt & sternutatiōes antea cōprehensis iritate, eliciendæ pituitę grātia, haud parum conferunt. Proinde naribus pæoniae radicis puluis, atomorū instar contusus, inspirabitur. Cæterū si eger comitiali morbo affectus, faciem & oculos rubētes, venasque tumidas habeat, sanguinis ex venā maleolū interiorē perreptāte extractio, strenue ei auxiliatur. Quinetiā exsuris, appositis cucurbitulis, sanguis nō inutiliter vacuabit, et caput opportune oleo rosaceo cum aeto irrigabitur. A vino vero, cepis, allio, sinapi, porris, apio, fabis, cānabi, & breuiter ab his quæ caput vaporem emittēdo grauant, ac implent, eger arcabitur.

Ex sanguinis copia,

Electuarium ad omnem morbum comitalem efficax. Pyrethri, seselis, stichados singulo

gulum drachma decem, agarici drachma
quinque, cardamomi recentis & acuti acro-
risque, ꝑ liquoris Cyrenaici præstantissimi,
aristolochiæ rotundæ singulorū sesquidrach-
ma, exprimiso ex scilla succum, ac eum æqua-
li mellis portione commixtum decoquito.

Hodie offi-
ciæ assam-
foetida uo-
cant.

Illoꝝ simplicibus medicamentis exceptis,
formato electuarium, cuius, nucis auellanae in-
star, cum liquore quopiam medicamentorū
vim ad caput dirigente, indies æger mane,
& tribus horis post frugalem coenam, assu-
met, & a crassioribus cibis interim abstine-
bit. Electuarium hoc omnibus morbi co-
mitialis differentiis, probe auxiliatur, si mo-
do vnā a G A L E N O descriptam exci-
pias, quæ scilicet ex sanguine ducit originē,
cuius & nos iam supra meminimus. Huic
sane sanguinis primum ex vena interiorem
maleolum perreptante missionem, deinde ex
axillari, presentaneum remediū adferre sæ-
pe vidimus. Victus autē ratio hoc malo im-
plicito, instituenda est, ex his quæ sanguinē
minuunt, atque refrigerant. Quocirca car-
e, vino, reliquisq; dulcibus abstinendum.

C ii & acido

PARA. IN NONVM

& acidorum fructuum succus ad debitā crassitudinem decoctus, loco potus porrigendus est. Itē capiti quoq; ea quæ refrigerandi vim possident, & alia quæ sanguinis impetū reprimunt, non inutiliter superaccommodabūt.

¶ De incubone, qui ἐφιάλτης Græce dicitur: Capit. xii.

& sanguine.

Cum quis in somno ponderosum quiddam sibi incubere imaginatur, & vox eius supprimitur, aut incerta indiscretaque editur, incubone correptus dicitur. Cui malo mox per initia succurrendum est. Nam si diutius se progauerit, crebroq; eos per noctē opprimat, gravius aliquod nunciatur malum, ut apoplexia, insania, & morbus comitialis. Quæ enim comitiales interdium, eadem ephialtici dormientes noctu patiuntur. Proinde si sanguineo colore, uenisq; turgidis, æger fuerit, ex malleoli vena sanguinem detrahemus, ac suræ cucurbitulas cum cutis incisione, agglutinabimus. Præterea laborantem a vini potu, & dulcium ciborum esu (in primis ab his quæ copiosum sanguinem generant) dehortari commodum erit. Si no-

notę contrarię pituitam indicantes adfuerint, aliu catapotijs coccijs ducere, & ægro victus rationem extenuantem, ac incidentē instituere, vtile erit. Exercitia quoq; & inferiorum partium frictiones, haud paruum momentum ad huius morbi depulsionem adferunt.

¶ De melancholia. Caput. xiii.

SI alienæ cogitationes absq; euidenti cā aliquē occupauerint, & inter cætera animi pathemata, metus, moestitia, odiumq; hominum præualuerint, illi melancholiæ initium adesse asserimus. Cæterum quādo malum vsq; adeo inualuerit, vt quæ animo concipit, proloquatur, & sermonem, & operationes inconstātes interturbatosq; ædat, melancholica quæ apparent signa, eam perfectā esse fatentur. Quem itaq; huiuscemodī vanę imaginationes, & metus, animiq; angustia detinent, priusquam increfcere, augescereq; coeperint, illi omnino subueniendū est, quoniam si hæc symptomata excreuerint, difficilem, ac plane cōtumacem curationē admittent. Quapropter si melācholię comites sint

Cura eius
quæ per cō
sortium fi

ven

P A R A. I N N O N V M.

ventris cruciatus, inflatio, ineptus ac vitiat⁹
color, prava concoctio, vomitus, ructusq; aci-
di, flatuorum spirituum copia, & sputorū
multitudo, curationem a venæ axillaris, aut
eius quæ ab ea inter minimum digitum,
& anularem sinistræ manus repit incisioe,
auspicabimur. Et si sanguis effluens, ater
crassusq; cernitur, multum sanguinis, sin au-
tem tenuis, & boni coloris conspicitur, mi-
nimum extrahendum est. Laborantem ve-
ro, his quæ alium lentunt & humectant, ex
quorum genere iuscula ex carne, hædorum,
& veruecum confecta sunt, nutrirī compe-
tit, statimque in balneum dulcis aquæ (in
quo tamen non diu desidebit) deducendus
erit. Post hæc subsequenti decocto epithy-
mi a me conscripto, prospere vteris. Habet
autem se in hunc modum. Myrobalanorum
Indicarum drachmæ decem, filiculæ (quam
πολυπόδιον Græci vocant) drachmæ quinque,
senæ drachmæ novem, turbit drachmæ qua-
tuor, stichados drachmæ decem, vuarum
passarum ab acinis mūdatarum tantundē,
epithymi Cretensis drachmæ decem, omnia
exceptio

excepto epithymo in tribus libris aquæ, ad
 sesquilibræ consumptionem, decoquito. his
 actis, adijcito epithymum, ac statim ab igne
 decoctum amoueto, & tâtisper dum refrige
 retur in eo epithymum madere finito, & il
 lis simul refrigeratis manibusq; contritis,
 ea percolato. Deinde sumito agarici scrupu
 los duos, aloës drachmam vnam, sacchari se
 drachmam, hellebori nigri sesquibolum,
 excipito hæc melle, aut & iuleb violato, infor
 matoq; catapotia, ac tribus horis ante deco
 cti propinationem, pro virium robore por
 rigit, deinde præscriptum decoctum ægro
 tanti exhibeto. Postea ꝑ triduū torum eger
 ad vires recolligendas conquiescet, ac illis
 interpositis diebus, quibus a medicaminū
 usu abstinebit, paulo ante dictis aluū leniē
 tib⁹ cibis, enutriēdus est, & potui vinū tenue
 & lucidū, bñq; odorū præbendū. Dehinc rur
 sus æger cōmemorata rōe euacuādus ē. Qui
 etiā tertio q̄q; et quarto interpositis interuat
 lis p̄ inferiora huiuscemōi purgationē molie
 mur. Interī tñ egrot⁹ a bilē atrā gignētib⁹ co
 hibeat, cui² generis caprarū magnarū caro ē.

† Aliq. he
 bdomadas
 tres scribi
 volunt

PARA. IN NONVM

& ferina, & vaccina, & suilla, & sale condita caro, & caseus vetus, & fabæ, & in primis lenticula oleraque vniuersa humectandi vim nullam possidentia. fugiat quoque vina crassa & nigra, exercitia & vigilias, caueatque ne vel fame, vel siti excrucietur. Sed his contraria tenue vinum, & frequentes & diutinos somnos, illi iniungere compertit. Prospicendum etiam lieni his remedijs, quæ in sequentibus, capite de inumescenti splenis præsidijs, prosequemur. Similiter os quoque ventriculi corroborandum est, medicamentis his, quorum mentionem faciam vbi ad ventriculi affectus deuentum fuerit. Cum autem nullum ex his, aut certe pauca, melancholie eueniunt, post phrenitidem vero, aut capitis ictum, aut diutinam in sole meram, aliquem occupauerit, mox inter initia sanguis ex humerali vena eliciendus est, & capiti ejusdem præsidijs, quæ his affectibus proprie dicata sunt, prospiciendum est. Ad hæc caput, modice feruefacta aqua, irrigandum, & insuper oleum rosaceum, aceto ex vino confectio dilutum, ab alto superfundendum. Similiter

Ex proprio
erebri affe
tu.

liter & lac muliebre capiti ægri immulgeri
prodest. Naribus quoque oleum seminum
cucurbitæ domesticę, & muliebre lac recte in-
duntur. Quinetiam in balneum, humectan-
di facultatem possidens, subinde eger dedus-
cetur, & aqua tepens liberaliter capiti infun-
detur, & ægrotans omnia odora, frigida fa-
cultate prædita, crebro naribus opportune ob-
ijciat. Ceterum si paulo ante dictorum me-
lancholiam nihil concomitetur, in prin-
cipio vena, quę ex humerali & axillari me-
dia est, brahij dextræ, incidenda erit, & san-
guis præscripta ratione examinandus, atq; ea-
dem, qua diximus medicandi, & alendi ra-
tione, egro subueniendum. Posteaquam ve-
ro hæc auxilia tentaueris, aliquot diebus e-
grum a medicaminum usu quiescere fines, &
deinde relictis viribus, ut prius curatio-
nem, tantisper dum ab omni malo libere-
tur, aggredieris. Verum uniuersum studi-
um, quod in melancholicis considerandum
existit, eo spectat, ut pinguiore corpulentia
oresq; crebris balneis potabilis aquę, & vi-
ctu boni succi & humectante, & cum decē-
ti ad

Vtriq; a-
bigentis
curatio.

Tribus me-
la. specie
bus coia.

P A R A. I N N O N V M.

ti animi delectatione reddantur, siquidē illi
co, simul atq; pingues obesiq; redditi sunt, a
proposita noxa liberantur. Proinde cibi illis
q̄maxime idonei censentur, veruecina caro,
hœdina, gallinacea, & panis similagineus,
nam furfuraceus, nulla ratione ijs apius uti-
lisue putatur. Vinum autem conuenit tenue
ac pellucidum, quoniam crassius nigrumq;
illis ineptum est. Præter hæc, lac etiam recen-
ter emulctum & adhuc repens his confert,
similiter & saxatiles pisces recentes, & sesa-
ma saccharo atq; amygdalino oleo p̄parata.
Ad hæc cantilenas, mimosq; ridicularū rerū
eorū audire, & alias res præ oculis habere, q̄-
bus maxime capiuntur exhilarantq;, et multi
somni, hoc morbo correptis, præsidio sunt.
Contra ex graui & frequenti cogitatione, so-
litudine vigilijsq; multis, graues illis noxæ
nascuntur. Catapota bilem atrā purgan-
tia, quę decoctum paulo ante descriptum ob-
nauseam respuentibus, porriguntur. Epithy-
mi Cretensis drachmæ viginti, filiculæ (quā
Græci πολυπόδιον vocant) agarici, vtriusq;
drachmæ decem, hellebori nigri, drachmæ
quinque

quinque, & sacchari tantundem, stichados
 drachmæ septē, pulueris hieræ picræ drach-
 mæ quindécim, finguntur ex his catapotia,
 & offeruntur eorum drachmæ tres, vel mi-
 nus pro virium ratione. Ceterum diebus,
 quibus a medicamentis æger liber quiescit,
 electuarij exhilarans inscripti, portionem
 opportune assumet. Hoc accipit, melisse, cor-
 ticum citri, t Caryophylorum, galliæ moscha-
 ræ, mastiches, croci Orientalis, cinnamomi,
 nucis myristicæ, cardamomi, peoniæ, 3^o been
 albi & rubri, zedoariæ, doronici ꝓ seminis
 ocimi maioris, seminis ocimi caryophilati
 singulorum pares portiones, moschi quantū
 pendet decima pars denarij vni⁹, insuper su-
 mito myrabalanos, chebulas numero vigin-
 ti, & emblicas numero triginta. hæc cōterito,
 & in tribus libris aquæ ad duarū librarum
 euaporationē, cōcoquito, & ꝓ colū trañcito,
 ꝓcolato quidē iuri, adñcito mellis librā vnā,
 & deīn rursus decoquito, quousq; vniuersa
 aqua euaporatu absorbeat. postremo trib⁹ hu-
 ius cocti mellis partib⁹, partē vnā ꝓdicto
 & medicaminū ī puluerē detritorū, adñcito.

Sic Ma-
 nar. salem
 Indicū in
 terpret.

† Alij Ga-
 ry. legūt.
 3^o Incogni-
 te veteri-
 b⁹ radices

Cum

PARA. IN NONVM

Cum autem vsus postulauerit, huius antido-
ti, nucis auellane instar, offerro. Sane electua-
rium hoc, animi hilaritatem, coloris iucundi-
tatem ac amoenitatem, bonæq; concoctionē
creat, adhæc canitiem quoq; retardat.

¶ De distillatione, raucitate & grauedine.

Caput. xiiii.

Ab aëre
fri-cere
brū com-
primete.

Cum aliquis post balnei vsu, aut ex-
ercitium, aut aliam quampiam occasio-
nem calefacientem, caput in aëre ambiente
frigidiorē, & ventis aquiloniis flātibus, de-
texerit, & inde naribus, & palato pruritus,
& titillatio, nimirum in spōgiolis ossibus,
& commotio, sternutationesq; prouenerint,
adhibeat lintheum calefactum capiti, & id tā-
tis per, dum calorem in profundū capitis pe-
netrare sentiat, relinquat. Deinde nigellam
naribus odoris gratia admoueat, & eius eti-
am puluere, aut struthij nariū foraminibus
inspirato, sternutationes prouocet. Præterea
ne peccans humor in dorsalem medullā flu-
at, supinum decubitu vitet, multam quoq;

Cū calida ciborum ingestionem, præsertim vaporoso-
rum, ac vini potum fugiat, Quod si affe-

ctus

ctus, linthei excalefacti vſu, nihil remittat, ſan-
guinē humerali vena ſecta, mittere, ac vētrē,
remedijs aluū leniētibus atq; emolliētib⁹, du-
cere expedit. Tale eſt ſubſequēs decoctū, qđ
tuſſe & thoracis aſperitate correpto, aluiq;
ſolutione indigenti, potui datur. Accipit aut
ſericas numero viginti, myxas triginta,
vuarum paſſarū ab acinīs liberatarū drach-
mas decem, violarum exiccatarū drachmas
quatuor, dulcis radicis a cortice liberæ, &
nonnihil contuſæ drachmas quinque, ficus ca-
ricas decem, decoquūtur omnia trib⁹ libris
aquæ, ad duarum aſſumptionem, deinde per
colum trañciuntur, & in percolato hoc deco-
cto caſſiæ fiſtulæ drachmæ ſeptem, mannæ
(quam antiqui mel aëriū appellat) drach-
mæ decem diſſoluuntur. Ceterum ſi ne-
q; venę humeralis incifio, neq; alui deiectio
opem attulerint, & materia quoq; in thora-
cem defluerit. Ad hæc ſi cum tuſſe febris
infeſtauerit, ilico vena axillari, aut ea quę ex
axillari & humerali media eſt, ſecta, ſangui-
nem mittes, & a carniū & vini vſu, ægrū
arcebis. Itē qđiu ingens calor, tuſſiſq; aſpe-

• Sic iuſu
bas & ſer-
be ſte iter
pretor.

PARA. IN. NONVM.

ra & arida perseverauerint, potui porriges hordei decoctum, aut iuleb violatum (Græcis iozulapon appellatum) quod ad hunc modum conficitur. Violarum vnciæ tres, in tribus sextarijs aquæ per diem macerantur, excolatæq; aque, libræ tres sacchari adijciunt. Verum calore se remittente, tussæq; sicca in humidam versa, ut iam expuat, infra scriptũ decoctum vna cum iam narrato iuleb violato indies tantisper dum pectus expurgetur, & tussi æger liberetur, voxq; pristinae claritati restituatur, propinatum, maximũ auxilium præstat. Quod decoctum accipit, ficus caricæ quinq; sericæ decem, myxas viginti, vuarum passarũ albarũ ab acinis mordatarũ drachmas decem, dulcis radicis cui cortex ablatu sit drachmas quinq; omnia donec tabuerint aquæ incocta, per colum traiciunt. Huius decocti quotidie vnciæ tres, admixtis iuleb violati drachmis quinq; porriguntur. Porro si inueterauerit tussis, molestaq; esse prexerit, curatiõem eius, ut capite de tussis præsidijs persequar, aggredieris. Ceterum si defluxus humorum ad nares Latinis graueo

RHAZAE DE MOR. CVR :24:

uedo Græcis $\kappa\omicron\sigma\upsilon\zeta\alpha$ appellatus perseverauerit, suffitibus per infumibulum, aut calamū in naribus transmissis, cohibebitur. Proinde si humor, qui ad nares decumbit, tenuis, acris, mordax suppalidusq; extiterit, suffumigationem ex γ sulphure aceto macerato posteaq; resiccato, tentabimus. Aut si libet, ex hordeo fabisue decorticatis acetoq; cōmaceratis, ac deinde exiccatis, aut ex saccharo cādidō, sandaloc; albo, suffitu prædicta ratione utemur. At si nullā caloris notam facies præse ferat, suffumina ex costo, vel thure apparatus, nam & hæc fluxus reprimunt.

✠ Legēdū
pūo furo
fure cum
Aut. non
sulph. cū
Mesue.

¶ De lippitudine, quæ ὀφθαλμία Græcis
uocatur. Cap. xv.

Q Vando adherescens oculi membrana, quæ natura alba est, ob sanguinis affluxum cruenta apparet, & ex oculis lachrymæ resudant, atque in maioribus oculi angulis sordes quædam colliguntur, egrum lippitudine infestari certum est. Quæ p symptomatū numero vehemētiaq; mō grauis, mō lenis existit. Verū inter huius vitij species, deterrima ea esse fert, quæ oculorūm
alba

P' A R A. I N N O N V' M

alba adeo inflata tumidaq; habet, vt nigredinem (quæ corneæ pars tota est, adherente membrana non obtecla) obtegere, palpebrasq; inuertere videatur. Mox itaq; per ophthalmie curationis initia, venam humeralem patienti oculo oppositam, in extrema manu pollicis vicinam, aut supra cubitum, secare iuuat, nisi leue malum fuerit, aut sanguinis fluxus constiterit. Siquidem tunc e directo partis læsæ, secta humeralis vena, opem fert. Quocirca q̃to vehementior affectus est, tanto maiorem sanguinis copiam detrahere decet. Post sanguinis autem detractionem, alius myrobalanis citrinis, manna (veteribus mel aëriū appellata) & fructuum quorundā, vt prunorum tamarindorū succo, ducenda est. Aeger quidem a carne, vino & cibis dulcioribus arcendus, parcior quoq; victus illi præscribendus est. Quod si hæc inefficacia fuerint, collyrium album lacte mulieris puellā lactantis læuigatum, oculis illinetur. At si sordium multitudo in oculis collecta sit, specillo lana molli inuoluto, ac aquæ rosatæ immerso, oculum a suis sordib⁹ liberare cōpetit. Dehinc
 oculus

puluis albus in spargendus, oculisque mollis
 lana & muliebri lacte imbuta, cum laxa fasci-
 cia (ne puluis lachrymis eluatur) illigan-
 da est. Deinde oculis ita molliter astrictis,
 & agro in tenebrosam demum deducto, om-
 ni studio & conatu, somnum illi conciliabi-
 mus, summo opere quoque cauentes ne in affe-
 ctum oculum, aut capite depresso & inclina-
 to, decumbat. Sint itaque omnia capitis indu-
 menta laxiora, ac minus stricta, nec diu pro-
 nus, imo potius supinus, cubet. Porro si a
 venę sectione, atque alui deiectione, oculus leui-
 or, & dolor eius sedatus, & tumor mollior,
 & lachrymę imminutę fuerint, balneum sub-
 inde eger conscendat. Siquidem hoc, morbi
 reliquias dissipabit ac depellet. Ceterum hu-
 midis sordibus oculique grauitate permanen-
 tibus, puluerem citrinum accommode oculo
 inspirabis. Ex horum remediorum gene-
 re, quod lippitudine vexatis multum condu-
 cit, etiam est linimentum superscriptum, epi-
 thematis instar fronti ac palpebris accommo-
 datum. Quod recipit. Glaucon preparati suc-
 ci, rosarum aloes, lycii, sandali rubri, nucis

† Huius
 etis natu-
 apud Pli.
 28, ca. 7.

PARA. IN NONNUM

Indicæ, croci Oriētalīs singulorū equas por-
tiones, ex quibus oībus inter se coriandri suc-
co cōmixtis, singunt collyria, & vbi vsus ex
postulauerit, vnū illorum coriandri, aut inty-
bi succo, aut rosacea aqua laxuigatū, dictis iā
partibus inungit, Hec remedio si eger vsus
fuerit, superis fauentibus, sanitati restituet.

Collyriū albū, Cerussę ablutę drachmę de-
cē, sarcocolle crassioris drachmę tres, traga-
gathę drachma vna, opij sedrachma, redigū-
tur in collyria, lenticulę instar. Puluis ci-
trinus, Sarcocollę crassioris drachmę decē,
aloës drachmę duę, croci tantundē, myrrhę
drachma, lycij drachmę duę, his in pollinē
subactis, vbi vsus erit, puluis oculo inspira-
bit. Puluis albus, Sarcocolla alba & pin-
guis, lacte mulieris potissimum iuuentulę
macerata, in vmbra tantisper dum exicce-
tur, relinquatur, deinde exactissime conte-
ratur, & singulis eius pulueris drachmis
decem, adiiciantur glaucij succi drachmę
duę, hæc rursus detrita in puluerem tenuis-
simum reponuntur, postulanteque vsu, oculo
insparguntur.

¶ De oculorum ulceribus. Cap. xvi.

Abscessum oculo innatum præfagiunt, ingens & vehemens punctilis dolor, pulsū magnitudo & vehemētia, multæ p-
fluētes ab oculis lachrymæ, & vniuersus ocu-
lus, aut abherescēs mēbrana sola, cruore suf-
fusa, quorū ruborē aptis oculis, aut inuersis
palpebris, intueri licet. Deinde in oculo vn⁹
locus altero sanguinolētior, aut in cornea cō-
spicua parte, locus aliq̃s alb⁹ apparens, ocu-
li quoq; abscessum indicant. Cæterū ad præ-
sentis affectus auxilia instituenda admo-
uēdaq; Medico in oculorū ægritudinib⁹ pro-
fligandis exercitatissimo, & natura sagaci
opus est. Veruntñ nos curationis capita &
summā, atq; præcipuā medicaminū rationē,
prosequemur. Dicimus itaq; vlcera in cohæ-
rente membrana (quā oculi albū nōnulli ap-
pellāt) oborta, nō ita esse perniciosa priculosa-
ue, vt sunt ea, quę corneę parti adnata mem-
brana nō obtectę, innascunt. At omnium
perniciosissimū vlcus est, quod corneę e pu-
pillæ regione euenit, siquidē hoc vlcus pupil-
læ procidentia subsequi quā ocysime solet.

D ii Huius

P A R A. I N N O N V M

flam. non
in suppurā
is curatio.

Huius itaque inflammationis curationem,
a venę humeralis incisione, auspicabimur,
sanguinis copiā quoad fieri poterit imminu-
entes, dein ad alui solutionē properabimus.
Et eger a carnium, & vini dulcis usu, arce-
bit, solatūq; interī refrigeratiū herbarum
esu, atque aquæ potu, contentus viuet. Ocu-
lo vero per initia, collyriū album muliebrī
lacte detritum, immittendum erit. Quod si
modo pulsus minor & tardior fieri, cæteras
que symptomata remitti videantur, spes est
morbum sine suppuratione solutum iri. Ac
si pulsus post detractum sanguinem, & de-
iectum ventrem, atque collyrii albi usū, ne-
que minor, neq; remissior, neque rarior, red-
datur, exigua spes superest inflammationē
illā, sine puris collectione, curari posse. Qua-
re tunc oculo collyrium ex thure inducendū
est, & ei puluinus aliquis ex molli lanula
consarcinatus, atque ita admotus, illigandus
est. Verum priusquam inflammatio suppu-
rescat, oculum leniter ne dolore excrucietur,
absque puluino constringere decet. Nec tunc
quoque a collyrii ex thure usu abstinere com-
petit,

in suppuran-
tis inflā. &
eleeris cura
flos

petit, quoniam tantisper dum inflammatio
 suppuretur, illud illinere confert. Pure vero
 iam nato, collyrium ex plumbo, quousque ca-
 uitas tota abscessus impleatur, vniuersaque ca-
 ro regeneretur, quam conuenientissimum erit.
 Hæc autem præsidia abscessu rupto, nec val-
 de magno existente, opportune tentantur.
 Nam si magnus pupillæque vicinus absces-
 sus sit, operæ præciū erit, oculo Eleisier, mox
 ad finem capitis subscribendum medicamē,
 accomodare, ac eodem tempore puluīnū quo-
 que ex tenera lana confectum, molliter oculo
 alligare decet, ne vlceris occasione, pupilla
 procidat. Proinde ad hæc, supinus decubi-
 tus depresso nonnihil capite, & a vehemen-
 tiore motu ocium & quies, egro conueniūt.
 Cæterum carne iam in abscessus ac vlceris lo-
 co regenerata, vniuersaque cauitate imple-
 ta, relinquetur in oculo alba quædā cicatrix,
 quæ, si profundius vlcus fuerit, crassior, si ve-
 ro in corneæ tantum superficie extiterit, te-
 nuior superficialiæque erit. Cicatrix tamē il-
 la seu callus, remoto vlcere a pupilla oculi, ni-
 hil incommodi adferre potest. Sin autem pu-
 pille

PARA. IN NONVM.

pillæ vicinior, post vlcis curacionem, alba
 cicatrix relicta fuerit, vicinitatis ratione vi
 sionem abolebit. Quapropter tum illis præ
 sidijs, quibus albugines absterguntur sol
 unturq; , vtendum erit. Collyrium ex
 thure, Ammoniæ, sarcocollæ vtriuscq; drach
 mæ quinque, thuris drachmæ decem, croci drach
 mæ duæ, omnia foenograci succo excepta, in
 collyria digeruntur. Collyrium de plum
 bo. Plumbi vsti & loti, stibij, pompholygis
 abluti, æris vsti, gummi Arabici, tragacan
 thæ singulorū drachmæ septem, opij sedrach
 ma, hæc simul contrita per tenuissimum pan
 num sericum cernuntur, et puluere aqua plu
 uiali consperso, informantur ex eo collyria.
 Collyrium deperditam vlcis oculi carnem
 regenerans, & pupillæ procidentiam prohi
 bens, & relictam cicatricem seu callum exte
 nuans abstergensq; , Cadmiæ ablutæ, pōpho
 lygis loti, serussæ, stibij, thuris singulorum
 drachmæ duæ, myrrhæ drachma vna, sarco
 collæ crassioris sesquidrachma, cinnabaris, a
 loës, opij singulorū drachma vna, formantur
 ex his collyria. Collyrium autem Eleifer
 vocatum

vocatum, quo ex vlcere procidentiam pupillæ metuentes vtimur, in hūc modū se habet. Stribii, lapidis hematitis vtriuscq; drachmę decem, acacię drachmę tres, aloës drachma vna, his cydoniorum nucleorum succo subactis informantur collyria, ac dum vsus expetit, oculo accommodantur.

¶ *Ad ea quę oculis incidunt educenda.*

Caput. xvii.

S I pilus, festuca, aut quid aliud oculo fortuito inciderit, sumito specillū resina pinea illitum, voluitoq; per oculum, et adtrahet id quod oculo illapsum est. Idē succinum attritu calefactū oculoq; admotum, præstat.

¶ *De albugine oculo innata,*

Caput. xviii.

Q Væ oculis innascitur albugo, cicatrix est, post vlcera curationem, dum eorum continui solutio restituitur, relicta. Quæ si in puerorum oculis oboriatur, faciliore curæ erit, q̃ in seniorum. Siquidē in senibus facta albugo, haudquaquam curationem admittit, nisi perquam tenuis & superficialia ac nubeculæ instar extiterit.

Præ

PARA. IN NONVM

Præsentem porro affectum, præsidij his discuties. Postq̃ eger balneo corpus emolliente egressus fuerit, aut facie q̃minime prona, vaporem aquæ calidæ, aut fœnogræci tepentis decocti, tantisper dum ipsa rubeat, receperit, infra scripti pulueris portionem oculo insparges. At si id remedium venas turgidas ac sanguinolentas effecerit, doloremque inflammatorium concitauerit, ab eo conquiesces, donec hi affectus oculi remissi fuerint, dein idem subsidium repetes. Medicamen præstantissimum albuginem probe detergēs citoq̃ discutiens, quo ego in exterendis albuginibus, neq̃ efficacius, neq̃ generosius, aut ylli par cemper. Accipe massacumiæ (quod ex plumbo, vitro, silice conficitur, quo scilicet fictilia vasa illinuntur) halcyonij, qđ alij spumam maris vocant, stercoreis magnæ lacertæ, nitri naturalis non facticij, sacchari albissimi singulorum pares portiones. dein sume acori, chelodonij ʒj viriusq̃ drachmas decem, & decoque in libra vna aquæ, ad trium partium consumptionē, postea percollaso, & hoc decocto comprehensas medicinas subis

Aliqui ad
dñe foenicu
34. 30.

subigito, et liquore imbibito, in vmbra exsic-
candas seponito, ac denuo contritas, & vt
prius aspersas exiccato, id vbi quater presti-
teris, rursus omnia vt prius exiccato conteri
toq; ac oculo puluerem inspargito. Siquidē
hoc medicamen nulli in detergendis albu-
ginibus, vt dixi, est secundum, nam crassio-
res albugines, etiam brutorum, vt equorum
& boum oculis innatas extergit.

¶ De scabrie & tunica. Caput. xix.

Cum palpebram inuersam interius ru-
bro colore suffusam, & asperam in
qualemq; aspexeris, scabie ea molestatur. Et
quando super oculorum alba & nigredinē,
quiddam tunicæ instar, venis multis crue-
tis & turgidis contextum cernis, affectus ad
est, qui Arabibus a tunicæ forma, sebel dici-
tur. Sane vtraq; hæc vitia graua sunt & diu-
turna, atq; ad curandum cōtumacia. Nihilo-
minus tamen inter initia, dum æger sanus
est, nec affectus inualuit, venæ sectione bra-
chij & frontis, & alui solutione vtatur. Et
ab esu palmularum, & sesami melle præpa-
ti, & temulentia abstineat. Præterea vacui

Ab ero-
dente hu-
more.

A suffu-
so sangui-
ne, in ad-
hærente tu-
nica.

corpo

PARA. IN NONVM.

corpore, nec cibis distentum agrotantē, sub
inde ad balnea deducere, identidem quoque
laboranti oculo collyrium rubrum illinere,
profunt. Collyrium rubrum. Lapidis hæ-
matitis, æris floris cremati ac loti vtriusque
drachmæ tres, eris vsti drachmæ duæ, croci
drachma vna, myrrhæ tantundē, piperis lon-
gi sedrachma, posteaquam vino veteri ea le-
uigaueris, redigito in collyria. Præter ista col-
lyrium viridē, capite de vngul descriptum,
si illinatur, opem fert. Quod si morbi hi
in vetustatem proruperint, scabies, inuersa
palpebra & instrumento (quod a palpebra-
rum rasura *ἐλεφροξύστον* Græci appellant)
per summa derafa, & tunica vero suppurati-
one, & concoquentiū vſu, perſanari debent.
At horum curationem præſentis libri me-
tē, quum ad manuaſem artē pertineat, haud
quaquam admittunt.

¶ Ad maiorum angulorū carunculas pru-
ritu uexatas. Caput. xx.

A morda
ci ſucco.

SV mito intybum tenellum ac virens, &
eo manibus exacte contrito, informato
globulos paruos inſtat oculi, & oleo viola-
ceo

deo circumlitos, ac oculis clausis superacco-
modatos, egrotanti somnum iniituro, illiga-
to. Verum rosaceum propositis affectui ge-
nerosius est citiusque auxilium praestat. At
si haec inualida fuerint, accipito lentes ex-
corticatas, rhum Syrenaicum, rosas rubras
& mali punici acinorum succum. haec trita
sapa, hoc est decocto vino, conspargito, ac in
morem emplastri, pruriginoso angulo in-
ducito. Quod si ne haec quidem suffecerint,
humeralem egrotantis venam primum inci-
dito, deinde eam, quae recta in fronte repit,
ac eas, quae ad maiores oculi angulos sunt.
Ventre quoque subinde medicaminibus
bilem flauam cientibus deijcito. Item egru-
identidem ad reprimendum humorum acri-
moniam in balnea dulcis aquae deducito.

¶ De ungui oculorum, quod ὀφθαλμια

Græcis uocatur Cap. xxi.

Q Vando aliquid membrulae nervosae
instar, ex angulo oculi nares spectan-
te oriri, & oculi albu obtegere, ac adu-
lq; nigredinem eiusdem protendi cernitur, affe-
ctus unguis appellatus, oculo innascitur.

Huius

Ob eam
etricis uel
expultrit
cis imbe-
cillitate.

PARA. IN NONVM

Chirurgia apud
Aeri. li. 7.
capite. 66.

Huius noxa tunc demum peior censetur, dū ad nigredinem quę e regione pupillę est, malum prorepserit. Hac itaq; membranula tenui existente, collyrio viridi, & collyrio ex æris flore, eam elidere tentandum est. Sed postquam in vetustatem & crassitiem vnguis deuenierit, scalpello ad id parato est euellendus. Collyrium viride, quod tuniculę sebel dictę, vngui & albę cicatrici auxilium præstat. Aeruginis drachmę tres, æris floris combusti drachmę sex, auripigmenti rubri, nitri, halcyonij singulorum drachma vna, salis ammoniaci drachma semissis, guttę ammoniaci drachmę duę, ammoniacum in rutę succo dissoluitur, et reliquis medicinis eo aspersis, informantur mirifice virtutis collyria, etiā si paulo vehementiora sint. Collyrium ex æris flore, quod vnguē exterit. Aeris cremati, æris floris vtriusque drachmę quinque, æruginis drachmę duę, salis ammoniaci, nitri, auripigmenti (quod sublimatum vocant) singulorum drachma vna, conteruntur omnia, & septimanę spacio, vt melius exiccantur, reponuntur, dein

de illis rutę succo conspersis, firguntur collyria, quibus vnguis affricatur.

¶ De uibice, ac cruentis suffusionibus ex ictu aliante causa. Caput. xxii.

Q Vando in oculo ex plaga, seu alia quavis occasione, maculam sanguinolentam fieri contigerit, sanguis ibidem ex affluxu collectus (postquam estus & fluxio conquieverint) discutiendus est. Sumito itaq; auripigmenti rubri, thuris, myrrhæ, ammoniaci singulorum æquas portiones, his hyssopi succo detritis, formato collyria, ac illa coriandri succo, aut hyssopi decocto læuigata, oculo illinito. Verum q̄ diu dolor perseverauerit, albumen oui oleo rosaceo cōmisceto, & lacram teneram illis imbutam, oculo illigato. Etiam columbæ sanguinem ex teneris alis expressum, statim per initia opportune instillabis.

Vehens
multū

¶ Ad lachrymas. Caput. xxiii.

C Vm maiores oculorum angulos perpetuo humore fluentes conspexeris, ægrum quotidie ieiunū, et corpore expurgato, ad balnea deducito, & oculo hūc subscriptū pul

A frigidi
humoris
affluxu.

P A R A. I N. N O N V M

puluerem, tenuitate atomis non absimilem, inspargito. Pulvis quidem iste accipit, pompholygis drachmas decem, coralli rubri & albi myrcalani citrinæ & contritæ, aloës singulorum drachmas duas, pipérís drachmā semissem, deterito hæc in pollinē tenuissimum, ac oculo crebro eum inspirato.

¶ De visus debilitate. Cap. xxiii. &

Ex humi-
ditate.

SI cum visus imbecillitate, manifestæ humiditatis notæ apparuerint, quæ tempore inediæ & exercitiij non nihil remitti videantur, catapotia coctia, leuioribus purgantibus præsidij tentatis, subinde egrotanti porrigere, & alimenta siccantia & extenuantia administrare oportebit. Vomitus

Ex siccitate.

quoque subinde post assumptos cibos incedentes frigare opportunum est. Oculis autem pulueres siccandi vim possidentes, vtiliter inspargentur. Quod si iam dictum affectum siccitas, corporisq; macies concomitetur, copiosius & humectans alimentum, & vini potus, ex usu erunt. Item aqua egelida capiti liberaliter infundenda, atq; ad teruide aquæ vaporem, facies inslinanda est. Nasus

bus

bus at ac auribus, oleū amygdalarū dulciū
instillandū, ac oculis lac mulieris adoleſcē
tulę quotidie, idēq; sepius est infundendum.
Hęc porro imbecilli vīsus species, famis tē
pore & vacua aluo, intētiōr quoq; redditur.

Compositio pulueris tenuissimi, vīsum
qui humiditatem suā imbecillitatis causam
obtinēt, exacuens. Accipito pompholygis
rosacea aqua abluti siccatiq; drachmas vi-
ginti, deinde exprimito sampſuchi virentis
succum, & nocte vna quouſq; resideat, quie-
ſcat, dein eū percolato, & eo succo aspersū pō
pholygem, donec exiccetur seponito, postea-
q; conterito, & sumito zingiberis, pīperis
nigri, pīperis longi, chelidonij singulorum
drachmas duas, salis ammoniaci drachmā
vnā, pompholygis sic vt descripsi prepara-
ti, drachmas viginti. hęc omnia conterito,
& succo virentis ſceniculi aspargito, & rur-
sus siccata ac contrita reponito, & exposcen-
te vſu, oculis inſciens, vtere. Præter iſta quo-
que propoſito affectui, collyrium ex fellibus
illitum optime facit, ſed valde acre & mor-
dax eſt.

Pu'uis ad
humidita-
tē oculi,

PARA. IN NONVM

¶ Ad palpebrarum tumorem, Græcis *χέ-
μοσις* appellatum. Caput. xxv.

A sangui-
nis influ-
xu.

fo. 25.

Oculo epithema humorum affuxum re-
primēs, capite de oculi lippitudine de-
scriptum, illinito.

¶ Ad palpebrarum pilos, oculos irritantes.
Caput. xxvi.

Ob siccitatem aut
pororum
obliquita-
tem.

Si pilus vnus alterue oculo infestus fue-
rit, alijs rectis palpebrarum pilis, masti-
che, aut oleo sesamino, agglutinato, aut radice
citrus eos euellito, ac locum, a quo euulseris,
mucronato ferro, aut acū, vrito. Verū si mul-
ti pili oculū irritauerint, necessitas tarsū præ-
scindere cogit. Ceterum eius negocij tracta-
tio, nostri propositi libri limites transcendit.

¶ De suffusione, siue humorum in oculum af-
fluxu. Caput. xxvii.

Qvandoque ante oculos culices ali-
cui, vel alia tenuia, lucentia, caligi-
nosaeque corpuscula perperam obuersari vi-
dentur. Quod nonnunquam proprię noxæ
oculi, nonnunquam ventriculi affectui, fer-
tur acceptum. Quare inter hæc duo discris-
men habendum est, neque sane hoc symptoma

ma

ma homines infestans, parui pendendum ē;
 quod si ob ventriculi vitiū euenerit, non me-
 tuendum, ne oculo magnam noxam adferat.
 Sin ex proprio oculi affectu sit, metu graui-
 oris mali non caret, siquidem id suffusionis
 initiū esse consueuit. Cæterum affectus hic,
 dum recens est, nondumque radices egit, lo-
 calibus medicamentis eliditur. At vbi ve-
 tustus perfectusque extiterit, sola punctori
 styli mucronis pertusione, curari potest, licet
 fortasse nec pertusio quidem opem adlatura
 sit. Quam ob causam inter hæc duo iam ea
 narrata, merito discrimen summo studio in-
 quirendum est, quod autem id sit perstringā.
 Cum igitur ytrique oculo, muscæ, aut culi-
 ces, aut quid simile occurrere videatur, pro-
 certo habendum, ex affectu ventriculi malū
 pendere. Si aut altero tantū oculo huiuscemo-
 di apparitiones conspiciantur, vitium oculo
 proprium esse iudicatur. Sic etiam quando
 cibis distenso ventriculo, & eo ingesta male
 concoquente, nausæque laborante, solito plu-
 res cerni videantur, tempore vero inediae,
 aut exercitiū pauciores hallucinationes eue-

Paul. lib. 1.
 ca. 27.

PARA IN NONVM

niant, & tunc quoque sciendum est, ab ore ve-
 triculi affectum pēdere, idque maxime si duobus
 tribusue, aut etiam pluribus mensibus
 suffusionis apparuerint accidentia, contem-
 plantique tibi pupillam nihil tenebrosum con-
 spiciatur. Dum itaque harum coniecturarum
 congeriem congesseris, & ueluti chorus qui-
 dam concinne loquatur, catapotia coccia
 porrigito, quibus si affectus in totum extir-
 patur, praedicta nouis indicationibusque
 fidem dabis. Ceterum si altero tantum o-
 culo visa fuerint, & singulis diebus perpetuo
 huiusmodi apparitio perseverauerit, nullo
 scilicet die interueniente, qui omni repre-
 hensione caruerit, censendum est suffusionis
 (quam aquam alij vocant) adesse initia, praesertim
 si altera pupilla tenebrosior, aut tur-
 bidior, aut (ut breuiter dicam) non exacte
 pura videtur, quae si ita se habeant, certo cer-
 tius est suffusionem esse. Quando itaque
 affectus hic ex propria dispositione oculi pe-
 det, prohibendum aegro ne cucurbitulis, neque
 ex venis in manum distributis, sanguinem
 extrahat, similiter quoque, ut piscium, & co-

Mali, ex
 oculi ui-
 tio cura-
 tio.

quæ hameclant. pituitosusq; succu gene-
rant, esum fugiat hortaberis. Alium ve-
ro frequenter catapontis coctis densies & æ-
grotum calefacientibus siccantibusq; ales, ac
q; hydromel potui illi propinabis. Oculis
vero collyrium ex fellibus opportune illi-
net. Collyrium ex fellibus, quod auxiliatur
incipienti suffusioni, & pupillæ dilatationi,
& his, qui post occasum solis non vident, &
nebetudini visus, humiditatem sui occasione
habentibus, hac ratione conficies. Fellis
grulæ, fellis piscis Arabibus; sabot dicti,
fellis hircini, fellis accipitris, fellis aquilæ, fel-
lis perdicis singulorū sicciorū vnū, aut plura,
non aridorū drachmis decē, adncies euphor-
biæ syluestris cucurbitæ, sagapeni singulorū
drachmā vnā, his simul omnibus attritis &
vna commixtis, asperges foeniculi tenelli &
virentis succu, & poscente vsu cum lacte mu-
liebris, aut oui candido, oculo immittes.

Ad nocturnam cæcitudinem, quæ νυκταλβία

Græcis dicitur.

Caput. xxviii.

Hic affectui idoneū est, hepar caprini
fenu & sectionib; sigulis neciū piper
E u longu

In initio Pat
luser Aetio
venā lecant

• Nos oculi
vitemur, Ga.
quoq; callo
nymi memi-
nit.

ab aquei hu-
moris & sp
ritum cras-
sitie.

PARA. IN NONVM

longum, & eisdē sectionibus oclufis, in clibanum hepar mittitur, & tantisper dum afficitur exicceturque, non tamen vratur, relinquitur, quo affato, piper longum extractum diligenter cum moschi momento cōteritur ac sanie, quæ ex asso iccore resudauit, cōspargitur, & exiccatum in pulueremque detritum, oculo insufflatur. Iam quoque ipsum iur cur opportune edendum porrigitur. Aut caprillum fel mellis commixtum, in æneo vase super ignem decoquito, & dein specillū felle intinctū, oculo admoveo, magis tñ profeceris, si collyrium ex fellibus oculo inūxeris. Porro si hæc omnia inefficacia fuerint, alui deſcito, ac sanguinem ex virisque humerarijs, & frontis vena, detrahito, victusque rationem extenuato.

¶ De dilatatione pupillæ. Ca. xxix

A. siccitate.

CVm pupilla hoc est foramē, quod propter vueā tunicam perforatā in nigredine oculi cernitur, vsq; adeo dilatatur ac patescit, vt omni ex parte alba oculi attingatur & si id post vehementem capitis dolorē euenierit, modica eius restitutionis spes habenda est.

est, Exigua autem existente dilatatione, vñ- Ab humoris
copia.
trem catapotijs coccij deſciet, ac identidem
collyrium ex fellibus oculo illines. Cæ-
terum ſi pupillam propter iſtum dilatari ob-
tigerit, haud quaq̃ formidandum, quia, niſi
yvea tunica diuulſa ſit, priſtinæ integritati
reſtituetur. Parabis itaq̃ ad huiuscemodî vi-
tium, emplaſtrum ex fabarum farina, chamæ-
melo & althæa, & hæc in vino & aqua con-
cuſa, oculo induces.

¶ De fiſtulis maioribus oculi angulis acciden-
tibus. Caput. xxx.

SI quando angulus maior madet, cumq̃ A putri & e
rodente hu-
more
ſcomprimitur, ſanies & pus emanant, fi-
ſtula ægrum moleſtat, cui ignito ferro præ-
ſentiſſime ſuccurritur. Verum eius uſum Apud Cel.li
5. ca. 28.
docere, ab huius libri tractatione alienū cen-
ſetur. Nihilominus tamen ſubiungam re-
medium, quod ſi accommodaueris, ipſam re-
ſudationem per mēſes plures ita cōprimes,
vt ager conualuiſſe ſibi videatur. Medica-
men hoc accipit, Aloës, thuris, ſarcocolle, a-
luminis ſingulorum pares portiones, erugi-
nis quantum pendet quarta pars vnius, hæc
crita

DE PAR. IN NONVM

erita, ac plantaginis succo subacta, in colly-
ria redigantur. Cum autem osus expetit,
fistulam donec universa sanies in ea coacer-
uata profluxerit, premito, deinde agrotu-
latus sanum, fistuleque non obnoxium, de-
cumbente, iam descripti collyrii in lacte
plantaginis dissoluti, tres guttas, aut qui-
tuor, non tamen simul, sed unam post ali-
am, iusto interposito intervallo, in magni
oculi angulum fistula tentatum, infillato.
Quo peracto, ager trium horarum spatio,
prædicta figura decumbet. In aurora inse-
cuti diei, rursus fistulam exacte comprim-
to, ac eandem curationem reiterato, atque
deinde septimana una, aut quam diutius
la pressa resudat, idem repetito. Si quidem
hac curatione, locus fistulae infestatus, si-
cus ad longum tempus feruabitur. In
oculorum autem præsidio, quantum præ-
sens institutum exigat, iam satis pertracta-
tum existimo. Reliqua vero quæ ad cun-
tationes, quæ ferro, ac manus administra-
tione peraguntur, pertinent, relinquam, quo-
niam multis remediis, atque longa pertracta-
tione

Russiame li.
4. secundum
locos Galeni

none, opus habent. Sunt tamen nonnulla ex
horum genere, in his libris, quibus de deco
ratione, & facis, tuendaque sanitate egre
mus, descripta.

De aurium dolore. Caput. xxxi.

Si aurium dolorem, faciei inflammatio pul
susque magnus & velox concomitentur,
sanguinem, ex humerali vena secta, agrotā
ti detrahito. Item oleum rosaceum oleumque
de floribus salicum, modice ad auris sensum
calentia, cum aceti paucillulo, in auditori
um meatum infundito. Lac quoque ita ca
lidum, uti est recenter emulsum, subinde
cum oui candido, auri instillato. Ventrem
autem myrobalanis citrinis, scammonio,
& aloë, vehementer ducto. Preparabis
autem huiusmodi medicamen, in hunc mo
dum. Sumito myrobalanorum citrinarum drach
mas viginti, & in pulverem contritas, dua
bus libris aque usque ad duarum librarum vni⁹ ter
tiarum consumptionem incogito, deinde decoctum
per colū transecto. Insuper accipito aloës drach
mam vnam, scammonij obolū vnum, hæc discocto
potionis succo aspsa, atque i catapotia digesta

Ex inflā
matione
contracto.

porri

PARA. IN NONVM

porrigito, & deinde post duarū horarū inter-
 capedinē decoctū p̄beto. Quod si dolor mi-
 nime conquiescens vrget, opij momentum,
 oleo rosaceo temperatum, auri immittito.
 Et si pulsus priori similis redierit, triduoq;
 talis perseverauerit, oleū ex sesami semine,
 in quo anatis, aut gallinę adeps dissolutus fu-
 erit, subinde sensim auri infundito. Siquidē
 tunc auri abscessus inest, cui suppurationē o-
 pus est. Quando autem dolor sedatus fuerit,
 suppurationem perfectā esse scito, & subitam
 insperatamq; ab aure puris profusionē exspe-
 ctato. Ceterum dum dolor auriū, post fa-
 stidiosam repletionem, aut ventos frigidos,
 molestauerit, oleum in quo ruta cepaue in-
 cocta est, tepidum auri immittito. Quod si
 hoc inualidum fuerit, oleū in quo turbit de-
 coctum sit, auditorio meatui instillato. Aut
 oleum liliorum, cui ad singulas yncias, eu-
 phorbij recentis & castorei vtriusque drach-
 ma vna exactissime leuigata, adiecta sit, in-
 fusum non minus iuuat. Porro si ne hoc qui-
 dem auxilium pręstiterit, aluū catapotijs coc-
 cijs ducito, & laconicum primā balnei par-
 tem

crassis vi-
 scosisq; hu-
 moribus.

sem (in quo sudorē prouocet) intrare iubeto.

Vinum similiter vetus robustumq; illi ppi
nato. Si vero aurium dolori adsint sonit⁹

tinnitus et flatus, panicū siue miliū in frixo-

rio torrefactum, identidem feruidum per sac

culos, superaccommodato. Aures quoq; æ-

gri ad vaporem aquæ, cui mentastrum, sti-

chas Arabica & sampsuch⁹ incocta sint, in-

clinato. Ad hæc castorei & euphorbiæ vtriuf-

q; pondus quatuor granorum hordei, sam-

buci oleo dissolutum, & deinde auri infu-

sum, magnum adfert præsidium.

¶ De auris ulcere. Caput. xxxii.

PVre ab aure profluente, mulsa tepida

crebro in vno die infundenda est, dein

de infra scriptum hoc medicamen, præsentī

affectui multum accommodum, est inijciē-

dum. Sarcocolle, aloës, cinnabaris, thuris sin-

gulorum drachma semissis, squame ferri, æ-

ruginis, vtriufq; obolus, omnia aceto leuiga-

ta, in aurem infunduntur. Vel linimentum

cortile ex linteō, melle imbutum, ac dicto iā

liquori intinctum, in aurem mittitur. Aeger

quoque tantisper hoc medicamine, & mula-

sa,

14
Ex flatu
oso spiri-
tu.

la, dum auris curetur, opportune vti poterit.
 De sonitu & timore audiunt.

Capit. xxxiii.

Nonnunquam hoc vitium ob exquisi-
 tum audientis sensum, elusque acrimo-
 niam oboritur, cuius certissimum indicium
 putatur, si tempore inedie increverit; cra-
 pulæ vero & repletionis remissior fuerit.

Hic igitur affectus, cum lenior sit, sibi de-
 dicatam curationem nullam exposcit, nisi
 forte aggravescat. Tum enim opij grana
 duo oleo rosaceo soluta, ac in aurem dimisi-
 sa, illi (sensu nonnihil stupefacto) abunde
 auxiliantur. Si vero capitis gravitatem, &
 auditus imbecillitatem sibi comites sortitus
 fuerit, oleum seminis raphani, & oleum a-
 mygdalarum amararum, & oleum rosace-
 um, in quo castoreum fuerit detritum, audi-
 tus meatui instillabis. Aurem quoque ad va-
 pore[m] aquæ, cui sampsuchus, stichas Arabi-
 ca, absinthium, mentastrum & origanum inco-
 cta sint, opportune inclinabis. Et alium ca-
 tapseis coccijs deijcies, & vinum agrotan-
 sis subtrahes, parcesq; ales.

Ex euapo-
 ratu crudi
 humoris.

Ad grauem auditum. Cap. xxiij.

Cum autem auditus grauitas, hominem occupat, perpendendum est, an in aure sordes (quas a consistentia ceram nominant) coaceruatae sunt. Quoniam huiusmodi sordibus ibidem inueteratis, pharmacis mihi supra ad auris vlcera narratis, aut nitro in aceto subacto, aut manuali opera expurgabuntur.

Verum si non sint sordibus infecta, & auditus grauitas post copiosam ciborum ingestionem, aut morbum acutum, humores ad aurem in eius indicatione protrudentem, oborta sit, aure vaporem aquae, cui paulo antedicta incocta sunt, recipies, idque per infumibulum, quoties vapor in aurem penetret. Curabile autem id rectissime ad hunc modum.

Mentastrium, absinthium, sampuchum, atque ante iam commemorata, in aenea olla aqua plena, & ad hunc usum idonea, ore scilicet angustiore decoquito, ac deinde infumibulum ollae orī accommodato, & ne vapor exhalet, linteis infumibulum, & olle os circumposito, ac deinceps aurem super infumibulo

A crasso humoribus

liori

PARA. IN NONVM

li orificium inclinato. Præterea collyrium hoc auditorio meatui instillato. Sylvestris cucurbitæ drachma vna, nitri scrupulum vnu, castorei, aristolochiæ rotundæ, succi absinthij singulorum drachma semissis, costi sesquibolus, euphorbij obolus, fellis vaccini quantum ad simplicia excipienda sat est, informato ex his collyria, et cū vsus exigit, vnum oleo amygdalarum amararum detrictum, auri pedetentim, ac continue infundito. Hoc enim præstantissimum adfert præsidium dolori, qui ex pituita & flatulentis spiritibus est, & sibilo, & tinnitui, surditatiquæ, qui affectus omnes, viscosorum crudorumque humorum soboles sunt. Porro si auditus grauitas post ieiunia, crebrasque vigilias oboriatur, & fuerit facies emaciata, & oculi concaui, eger balneum dulcis aquæ petat, & copiosiori potu, ac cibo humectante vtatur, somnosque plures sibi conciliet. Caput quoque aqua tepida cum oleo humectandi vim obtinente, donec sanescat, perfundat. Quod si a phrenitide hoc genus vitij inuaseric, præsidij capite de aurium sonitu descriptis curatur.

Ad au

ex sicci
te

ex pur
ato hu
nore per
risim

¶ *Ad aurium vermes, & animalcula auditus
meatum irrepentia.* Caput. xxxv.

Cum auditorium meatū titillatio, pruritus & dolor molestant, & vermes inde excidunt, auri mentastri succus, aut foliorum persicorum, aut oleum nucleorum maiorum persicorum, aut aloem succo absinthij detritam, auri immitte, hec namque vermes, & animalcula aurem irrepentia, aut in viceribus nata, interimunt.

¶ *Ad ea quæ in meatum auditorium incidunt, euellenda.* Caput. xxxvi.

Quando aliquid meatui auditorio infigitur, oleum tepidum illi infundito, & ægrum in balneum potabilis aquæ deducito, atq; in eo tantisper dum mollius corpus eius reddatur, immorari finito. Deinde naribus struthium in puluerem subactum, inspirato, aëremq; per inspirationem attractum, donec sternutatio iritetur, egrotantem retinere iubeto, huiuscemodi namq; cōcussu fortasse id qd' meatui illapsum est, eicietur. Si vero maius fuerit, q̃ quod excidere possit, forpicula, aut ferro instar retusi hami in aurē
dimis

demisso, operæ pretium est extrahere. Quin
etiam idem quoque in naribus, si usus expe
rit, tentandum est. Porro si in porum audi
torium aqua deflexerit, capite versus eā par
tem, in qua patiens auris est, inclinato, in v
no pede subsiliat rger. Quod si non excer
nitur, sternutationem ut præcepi, provoca
to, deinde tepidum oleum subinde auri in
stillato. Neque hoc malum parum nos anxi
os reddere debet, præcipue si id quod in aurē
inciderit, aut ingressū sit, tetra qualitate pol
let. Inde enim grauis cruciatus subsequi, &
in aure inflammata si intus maneat, conuul
siones adferri solent.

¶ Ad sanguinem e naribus erumpentem.

Caput xxxvii.

EX eorum genere, quæ sanguinis e nar
ibus profluitum sistūt, est succus ocimi
maieris, in quo camphora leuigata sit, & na
ribus ita immixtus. Auxiliatur enim huiusce
modi succus hoc affectu implicari solitis, aut
ante fluxum sanguinis, aut tempore proflua
ui naribus illitus. Vel accipito gypsum, ci
nerem chartæ ex linteis præparatæ, gallæ,
cinna

cinnabarim, calcē viuā, chalcithidē, et hęc sibi
 mul in puluerem detrita, narisbus inspirato.
 Vel linimentum tortile ex linteo, his pulue-
 ribus albumine oui exceptis, imbutum, nari-
 bus immittito. Aut alumen scissile in pulue-
 rem longe tenuissimum actum, cum pari por-
 tione amyli, narisbus insufflato. Quod si co-
 piose sanguis profluere perseuerat, brachiorū
 partes axillis vicinas, zonis, aut cordulis vin-
 cito. Quinetiam vt sanguinem in contrariū
 trahas, formora quoq; ac testes vinculis itera-
 cipito. Porro si affectus inualescat, incisa hu-
 merali, partis illius vnde sanguis profluit,
 sanguinem per interualla modice detrahē,
 confert. Si quidem nec hac ratione sistitur,
 magnas cucurbitulas ignitas hipochondrijs,
 ea parte qua sanguis fluit, affigere, cutemq; si
 opus sit, leniter incidere, consilium est. Me., *NCB.*
 dicamen sistendo sanguini longe efficacissimū.
 Accipies calcem albam, qua aurifabri
 vti cōsuevere, & subinde triā citra cūctatio-
 nē narisbus inspirabis, vel linimentum fun-
 culare oui candido liquore illitum, eaq; cal-
 ce imbutum, narium foraminib⁹ immittes.

Ad

PARA. IN NONVM

Ob mate-
ria adusti-
onē.

¶ Ad narium crustas & ulcera. Ca. xxxviii.

CRustis, quas Græci $\epsilon\sigma\chi\alpha\rho\alpha\varsigma$ uocant, in narium obortis, ceram & oleum humectans, cuiusmodi violaceum est, & galli naceum adipem illines; atq; ægri narium crebro, diebus aliquot, aquæ calidæ, cui emollientia, & humectantia incocta sint, vaporem mane obijcies. Cæterum crustis iam emolli- tis ac prolabi incipientibus, linimentum tor- tile aceto acerrimo sale cõtemperato inuinc- tum, naso inseres, ac crustis ipsis acetum cum sale superaccommodabis, siquidem eo aceto exiccata, diutius narium non inhærebunt. Quod si vlcera ibidem oboriantur, vnguen- to cerussæ opportune ea restitues.

A materiæ
æ affluxu
& cõcoc.
& expul.
imbecillitate,

¶ De polypo & sarcomate. Caput. xl.

Cum parte interiore narium, caro superflua, mollis, & quasi laxa & rubra albaue innascitur, & nares quoq; crassescere incipiunt, iamq; dicta carne impleri, hume- ralē venam primum incidere iuuat, deinde linimentum tortile vnguento viridi imbu- tum, narium impositum bene facit, eius au- tem vnguēti libro septimo Almanfori dedi-

cato,

tato capite septimo de carnem exedentibus
 remedijs, memini. Constat autem, ærugi-
 nis & despumati mellis vtriuscq; vncia. qui-
 bus nonnulli addunt sarcocollæ drachmam
 semissem, & ammoniaci tantundem, quæ v-
 na cum ærugine, melle & aceto excipiunt,
 atque in formam vnguenti digerunt. Ve-
 rû si hoc non vsq; adeo efficax fuerit, 3^o me-
 dicamen mordax ibidem a me descriptum, Mellezæ
bereg. Afæ
uocant.
 tantisper dum plane locus expurgatus exe-
 susq; fuerit, parti laboranti inducetur. Præ-
 terea affectui huic nōnunquam ferro, excin-
 dendo radicitus carunculam illam succurri-
 tur. At medici id tentantes, interdum graui-
 ter delinquunt, ac egrû, affectus differentiã
 non perpendentes, in magnum vitiû indu-
 cunt. Nam in naribus quoq; cancer subinde
 nasci solet, quem sine discrimine cum poly-
 po confundunt. Quum itaq; hoc in loco obor-
 tus cancer, neq; mordacia fert medicamina,
 neq; quæ ferro sit præcisionem, consiliû est,
 leniter illum attrectare, & præsidijs lenien-
 tibus, & sanguinis missione, & alui solutiõe
 osum tollere. Cognoscitur vero, an huiusce-

P A R A. I N N O N V M.

modi affectus, cancer sit, ex eo videlicet, si durus est, & venas tumidas habet, & ad palatum usque nonnunquam prorepit. Proinde naribus siccis durisque existentibus, ac nullo ab illis manante humore, sumopere cauendum est, ne cancer, aut huic similis affectus, ferro acerbisue medicamentis iritetur. Verum si, que naribus caro innascitur, laxa mollisque fuerit, & humores e naribus profluxerint, ac si pressus nasus, mollem, nec tactu durum sese offerat, non metuendum est, quin acrisum medicaminum usu, & ferro subueniri illi possit.

¶ De oblæsa olfaciendi facultate.

Capit. xl.

Q Vando sensus, quo odores persentimus, deperditus est, & naribus nulla superflua caro increuit, & aer solito more per nares attrahitur, & oculi sensuumque reliquorum organa, naturalibus munijis apte funguntur, naribus puluerem tenuissimum ex struthio, † cyclamine & sale ammoniaco, inspirabis. Aegro quoque, ut nares vaporis excalescenti aceti admoueat, præcipientes. Verum si hæc inefficacia sint, subsequens me-

b frigidū
i. organis
factus ipa
um.

lias artemi
i.

dicamen naribus illinetur. Cuius compositio in hunc modum se habet. Nigellæ, fellis gruis, cucurbitæ sylvestris, veratri albi singulorum pares portiones, hæc detrita in puluerem, & vrina cameli Arabici, quantum ad contegendas medicinas sat est, excipiuntur, deinde ad solem exiccanda reposita, tandem in pastillos lentium instar, digeruntur, exigente autem vsu, vnus illorum oleo sampsi chi solutus, naribus inducendus est. Siquis dem hoc remedium, præserti affectui est aptissimum. Quod si hoc medicamentum suo calore & mordaci facultate, magnum dolorem excitauerit, oleum seminum cucurbitæ domesticæ, narium foraminibus inunges, & capiti aquam calidam liberaliter infundes. Sorbitiones quoque actu calidæ & humectantes, agro conducunt, ex quorum numero sunt prîsana, & furfurum decoctum, eaque quæ farina & alijs frumentaceis seminibus, præparantur. Et subsequens quidem præsidium ad deperditum olfactum efficacissimum putatur, quod in hunc modum conficies. Cõterito nigellam in puluerem tenuissimam

Eius vsum
docet Pli. li. II.
28. Ca. 8.

PARA. IN NONVM.

& cum veteri oleo subigito, deinde agri capite (ore aqua impleto) quantum licet retrorsum reclinato, comprehensi medicaminis aliquot guttas naribus instillato, & laborantē quoad potest, aërem ambientē attrahere præcipito, hocq; tribus insequentibus diebus & ternis vicibus facito. Cæterum si ob medicamenti acrimoniam, rosio aliqua concitetur, ea quæ prius dolori vtilia præcepi, naribus admouebis.

Exinflama
tione.

¶ De dentium & gingivarū dolore. Ca. xli.

SI contingat gingiuam vna cum dentium dolore cruentam simul & tumidam, & rubro colore suffusā esse, tumereq; tumore pulsatili, cucurbitulis scopulis, aut inferiori mandibulæ affixis, sanguinem detrachito, prius tamen secta humerali vena. Deinde ore aliquādiu acetum cum rosaceo, donec tepuerit, retinendum præbeto, quo eiecto, idem rursus repetat, ac postea solum rosaceum frigidum ore retineat. Verum si ea ratione affectus non sopiatur, sitq; cum inflammatione pulsus vehemens, camphoram vna cum pyrethro contritam, dentium radicibus

ad

gingiuas applicato, & postquam puluis de-
fluxerit, a saliuacq; elutus fuerit, alium secun-
do diligenter inspargito. Præterea lanā mol-
lem oleo rosaceo imbutam, denti applicato.
Quod si dolor non remissus aliquando in-
crudescit, grauiorq; redditur, opij obolū ro-
saceo læuigato, & illo circumlitam lanu-
lam quamminime sordidam, radici affecti
dentis adhibeto. Si ne sic quidem dolor re-
quieuerit, gingiuis scalpello leniter incisis,
sanguisugas admoueto. Porro si gingiua,
neq; cruenta, neq; tumida sit, neq; pulsatili
dolore infestetur, & facies absq; inflamma-
tione cernatur, sed dolor a nausea, & copio-
sa ciborum ingestione, & coena ægrum in-
uaserit, ægerq; multis cibis refrigerantibus
usus fuerit, alium catapotijs coccijs deijcito.
Et dolore affectorum dentium radices, sub-
scripto medicamine circumlinito. Quod ac-
cipit, pyrethrum, sinapi, thapsiam Indicam,
nitrum, piper & zingiber, quibus in pulue-
rem detritis, dentium radices infricabis. La-
nam quoque tenellam illis inuolutam, den-
tium finibus circa gingiuas apponito, prius
camen

Ex frigida
humoris af-
fluxu.

PARA. IN NON V.M.

tamen ore, aceto in quo pyrethrum, menta-
strum, & origanum ebullierint, abluto. Ex-
trinsecus autem panicum, siue milium in
frixorio tostum sacculoq; insutum, genis ac-
commodato, aut piperis puluere melle sub-
acto, dentem eiusq; radicem infricato. At si
hæc inualida fuerint, dentium finibus, hæc
theriacam superposito. Castorei, laserpitij,
hoc est succi Cyrenaici, piperis, gingiberis,
styracis, opij singulorum pares portiones,
hæc melle leuigata, denti inducito. Aeger
quoque ad tempus a cibo abstinebit, & sub
inde laconicum primam balnei partem, vt
sudor copiosus erumpat, ingreditur. Si au-
tem nec sic dolor sedatus sit, ferro candentis
dentium radices subinde contingito, vel pe-
nitius extirpato. At erosionem tentato denti;
medicamenta sequentia, vt quæ vehemen-
ter exedant, imposito, aut in totum den-
tem euellito.

Medicamenta eradicantia & confringen-
tia dentes. Caput. xlii.

Medicamen qd exelo denti immissum;
ipsum remittit dolorē, ac ipsum tco
minuit.

Ob præstan-
tiā ab auto-
re theriaca
appellatur.

† alias cōstri-
git.

minuit. Sumito; herbam lactariam foeminā
 (quam Græci τινδυμαλον μυστίτην vocant) &
 piper, his commisce cedri resinam, dentiq;
 excavato imposito. Medicamen imbecillos
 ac dolentes dentes eradicans. Accipito ra-
 dices mori, radices capparis, pyrethrum, lac-
 tithymali, liquorem volubilis maioris (qui
 Græcis κισσάμπελος dicitur) cucurbitæ syl-
 uestris radicem, & auripigmentum ru-
 brū, & his tritis, acetum quantum vt inter
 se cohæreant satis est, inspargito. Et acetum
 quoq; vnus hebdomadæ spatio (vt exacte
 conglutinentur pulueres) singulis diebus
 pari modo, vt prius, adnectito. Deinde den-
 tes circumquaque scalpello rasos, prædicto
 puluere decies in die, donec facile mouean-
 tur, diligenter illinito, eaq; ratione extrahi-
 to. Aut plussculis diebus dentem force aceti
 acerrimi, madefacito, vt mobilē postea extir-
 pes. Vel fluuiatiles ꝑ ranas, oleo tātis per dū
 marcescant, incoquito, & exigente vsu, den-
 tes prius tamen circumcisos, huiuscemodi o-
 leo illinito, ac sic dentes laxatos, instrumen-
 to ad id parato, eradicato.

✧ Nonnulli
 KebeKēgira
 nūculū ite-
 pretatur.

✧ Potius a
 depresso vi-
 ridis arbori-
 bus degētis.

Ad re-

PARA. IN NONVM

¶ Ad restrictionem & stuporem dentium.

Caput. xliij.

Hic affectui portulaca & amygdala amara, vel quę viribus his respondent, commanducata, auxilium præstant. Sal quoque si eo perfricetur, aut cera commasticetur, non parum iuuant.

¶ Ad dentes, qui frigidi contactu indolescunt.

Caput. xliiij.

Oleum excalefactum linteoque exceptum, admoueto, aut oui vitellum assum, aut calentem panem masticandum porrigito, aut balsamo oleoque iridis, dentes affricato.

¶ De lingue orisque superficialiis ulceribus.

Caput. xlv.

Si ulcera sanguinolenta sint, accipito rosarum seminis, amyli, cinerule, lentium excorticatarum, seminis senæ ex Mecha, singulorum pares portiones, camphorę paululum, his in puluerem subactis aphthas affricato. Præterea eadem quoque aceto cum rosaceo oleo, & rosacea aqua excepta, ore retinenda præbeto, sanguinemque cucurbitulis scoptulis & faucibus a foris affixis, minueto.

Ac si

albican

albicantes papulae sint, sale & melle illinito,
& syrupum acidum vocatum, aut muriam,
ad oris collutionem porrigito.

¶ De gingivis sanguine humentibus.

Caput, xlii.

AD gingivas sanguine tenuiore perpe-
tuo fluētes sanandas, accipito auripig-
mēti rubri & citrini, calcis, gallarum imma-
curarum, aluminis singulorum pares portio-
nes, his in pulverem subactis, & aceto pera-
cri exceptis, informato pastillos exiguos, &
ubi vsus exigit, eorum obolum sumito, eoq;
adamussim detrito, gīgiuas infricato, ac po-
stq; liquor ille gingivis aliquandiu adhæse-
rit, rosaceum oleum aegro retinendum præbe-
to. Est enim id præsentī affectui, tum putre-
dini, & herpeti exedenti, qui os infestari con-
suevit, remedium præsentissimum.

¶ De laxatione procidentiae gurguli
onis.

Caput, xlii.

CUm aegro radici linguæ, aut faucibus
videtur quippiam incumbere, & quan-
do os adaperit, seu linguam exerit, eius gar-
garco laxatus elongatusque propendere con-
spici

Columella

P A R A. I N N O N. N. V. M.

Scribō
eius loco
gallā con
tusam ha
bet.

Vua.

Spicitur, sumitō compositionem ramech ab Arabibus vocatam, in quam gallæ immatū ræ, & vuę passę ingrediuntur, deinde accipi to salē ammoniacū, ac ea in tenuissimū pul uerem simul redacta, instrumento ad hoc a pro, super columellam inspirato, atq; huius instrumētī mucroni narrati pulueris momē to appposito, ad columellæ radicē sensim cō tingendam instrumentum dirigit, columel lamq; eo pauxillum foras attrahito. Id au tem instrumenti genus ab vua attollenda σαφυλή παρτον dicitur. Aut si voles ex malo punico acido, vna cum sua carne cōtrito, gar garizationes parato. Ceterum si diutius ita producta propenderit, ipsiusque pars su perior, qua scilicet palatō adnectitur, tenuior extiterit, caput vērō quo linguā spectat vuę instar, rotundum atq; orbiculare increuerit, radicitus eam (candenti ferro ad id parato, ac per canalem aliquem ori immisso) præscin dito. Caueto tamen ne priusquam ad eam si guram perueniat, eam amputes, siquidem ta lis sectio interdum tantū concitat sanguinis profluxum, vt nullis præsiidijs sisti queat.

De hic

De hirudinibus gutturi incidentibus, aut alijs
reptilibus fortuito irreptantibus.

Caput. .xlviij.

Dum quis in gutture pruritum titilla-
tionemq; experitur, & sanguis tenuis
modice inde resudat, suspicito est, hirudinem
deuoratam esse, præcipue si aquam cui hiru-
dines innatant, hauserit. Aegro itaque ore
magnum hiare, & linguam exerere præci-
pito, & linguæ basi pressa, fauces ad solem
inspicito. Iam si sanguisugam prope adhæ-
rescere conspexeris, vulcella, quibus tela ex-
trahi solent, capite eius compresso, sangui-
sugam euellito, talique industria egrum ab
ea liberato. Verum si conspectum hirudo
fugiat, æger subinde sinapi cum aceto gar-
garizet, siquidem acribus incitata, a loco
cui inhaeret, dimouebitur. Vel ex aceto &
succo Cyrenaico, aut sale, gargarizationes
ad eandem utilitatem, ægró tantí porriges.
Præterea nigellâ & sinapi trita, gutturi utili-
ter inspirabis. Itē ex cepe succo gargarizatio-
nes præbebis. Ceterū si post euulsâ hirudinē,
sanguis fluere perseverat, ex iure cui malū
puni;

P A R A . I N N O N N V M

punici cortices, balauſtia & rhus coriarium incocta ſunt, gargarizationes parato. Gut-
turi quoq; balauſtiorum puluerem, thus, cin-
nabarim & amyli inſufflato. At ſi ſtomacho
hirudo adheſerit, medicamina quibus ver-
mes propelluntur, propinato. Ex horū quo-
q; genere, quæ hirudines diuertunt, prima
balnei domus cenſetur, ſi illi æger tantisper
dum multa ſitis ipſum vrgeat, immoretur,
ac deinde aquam frigidiffimam, niue ſcilicet
infrigeratam, ore contineat, & quum aqua
tepuerit, eam reſciat, aliamq; recipiat. Hi-
rudo ſiquidem aliquoties frigoris cupida,
ad os prorepat.

¶ De his quæ in os, ſeu œſophagum
prolabuntur. Cap. xlix.

SI quando quod in guttur deuoluitur, œ-
ſophago, aut eius parti tanquam infarci-
tum inhæreat, ſicq; id, aut bolus aliquis grā-
dior, aut quippiam illi nō abſimile, nimirū
quod nec aſperū, nec anguloſum ſit, aut para-
tibus inter ſe diuiſis conſtet, iuuat identidē
ægri ceruicem concutere, ac liberaliter a-
quam tranſglutire, ea namq; ratiōe forſitan
ad

ad inferiora propelletur. Aeger præterea bal-
neum potabilis aquæ ingressus, oleum, aut a-
lia emollientia ac humectantia bibat, ac de-
inceps magnos bolos diglutiat. Si vero ne-
tum quidem in vētriculum procidit, instru-
mentum corporibus ex œsophago propellē-
dis adaptatum, ori immittitur. Est autē hoc
instrumenti genus ex plumbo factū, quodq;
cum longum sit, retisq; instar confabrica-
tū in omnem gibbositatem facile effingitur,
ac ea industria œsophago inuolutum corp⁹,
in ventriculum protruditur.

Magni ob-
lōga cerea
cādela ole-
o repēti in
tincta
cuntur.

¶ Ad oblæsum linguæ sensum, ac deficientem
motum. Caput. I.

Q Vando lingua cæteris mēbris illę Ex pitui-
sis, torpida redditur, nulla tamē fe- tæ affluxu
bris, aut alius acutus & ardens morbus, æ-
grum infestat, sumito salem ammoniacum,
piper, zingiber, sinapi album, pyrethrum, her-
bę pediculariæ semen, nitrum, origanum, sac-
charum, nigellam, sampsuchum aridū, ac ex
his simul in aqua decoctis, gargatizationes
parato, interim tamen prospiciat sibi a ger,
ne portionem aliquam huius liquoris deglu-
tiat.

PARA. IN NONVM.

tiat. Profunt quoque pluribus diebus iei-
iuno ægro, gargarizationes ex muria Na-
bathææ, aut aceto & pyrethro, præparatæ.
Vbi vero æger os colluere his cessauerit,
accipito salis ammoniaci, pyrethri, piperis,
sinapis singulorum æqualia pondera, &
his in tenuissimum pollinem subactis, lin-
guam diu huiuscemodi puluere infricato.

A nimia
siccitate.

Quod si linguæ stupiditatem, auditus, reli-
quorumque sensuum torpor concomitatur,
laboranti præsidij partium resolutioni di-
catis, subuenies. Porro si in acutis febril-
bus sermo difficilis fuerit, viderisque cum
sermonis difficultate, extenuatam & bre-
uiorem conuulsamque esse linguam, aqua ca-
lida in qua herbæ emollientes humectantes
que ebullierint, super colli vertebrae, & auri-
um principia, vbi scilicet mandibularum
articulatio est, opportune superfundetur.

Præterea partes illæ humectante oleo, infri-
candæ sunt, & ægrotanti oleum modice
inferuefactum, ore retinendum. Et si mul-
tum temporis lapsus fuerit, ex quo sermo
aboleri visus fuerit, aut si a primo ortu pri-
maue

maue conformatione id euenerit, opera pre-
cium est indagare, an ligula faucibus lin-
guam colligans, præter naturam excreue-
rit. Qued si inueneris, parum eam præsci-
dito, ac vulnere chalcithidis puluerē ad cru-
stam inducendam, inspargito.

¶ Ad linguam in nimiam molem intum-
mescentem. Caput. li.

Cum lingua in tantam molem incre-
uerit, ut ore retineri nequeat, fricanda
est cepis, aut citrorum acido succo, aut ri-
bes, aut malo punico acido, donec multa sa-
liua defluerit. Ea namque ratione decre-
scet, pristinaque formæ restituetur. Si ve-
ro id tamen non suffecerit, aceto & sale di-
ligenter linguam infricato, & si hoc quoque
inualidum extiterit, primum sanguinē ex
duabus humeralibus, deinde ex venis sub
lingua latitantibus, detrahitō.

¶ De tumore sub lingua enato, qui ranula
dicitur. Caput. lii.

Tumore huiuscemōi maligno sub lingua
accidēte, iter initia lingua sale ammoni-
co, et gallis cōfricāda ē. Vex eo tumore i ve-
tusta

¶ Veteri-
b⁹ icogni-
tū, Manar.
duseius lo-
corumicis
succo vti-
tur.

Græce βε-
ταχ'οο.

P A R A. I N N O N V M.

tustatem protracto, medicamine cruētis gingiuis dicato, lingua infricabitur, & agrotus deinde ore acetum cum sale contemperatum retinebit.

¶

Ad pustulas ac tumores linguae.

Caput. liii.

H Is eisdem remedijs quibus aphthis supra cōprehensis, & augine medemur succurritur.

¶

De angina. Caput. liiii.

Affectum Latinis anginam, Græcis συνάγχη, appellatum, testatur inter deglutiendum ac respirandum, percepta difficultas molestiaque. Qui morbus modo grauior, modo leuior, pro transglutiendi respirandique difficultatis magnitudine pronunciat. Quocirca quando transglutiendi noxae adsunt faciei & oculorum rubor, corporisque repletio, in ipsius curationis initio humeralis incidenda est, & gargarizatio ex malo punico acido cum sua carne, preparanda. Vel gargarizationem ex succo malorum syluestriū igne incrassato, aut rubi fructus succo, similiter parato. Et deinde ex rosacea aqua,
cui

Ex sanguinis copia.

cui rhois decoctū adiectū sit, collutionē por-
 rigito. Postq̃ hęc triduo diligenter sint fa-
 cta, & alius succo fructuū veluti prunorū,
 tamarindorum, cassia fistula, manna, quam
 veteres mel aeriū appellarūt, fuerit soluta,
 gargarizationes ex decocto ficuū caicarū,
 & vuarū passarū, vel e medulla cassiē fistu-
 lę cū hydromelite porrigito. Si aut malū lō-
 gi⁹ prorogat, gargarizatiōibus & ispiratio-
 ne acriū medicaminū, quę subiiciā, vtemur.

At si nullo in facie rubore æger suffusus
 fuerit, & copiosa pituita ab ore profluxerit,
 ad hęc si egrotans frigida temperie sit, sta-
 tim inter initia aluū catapotijs coccijs denūci-
 to, & acriorem clysterē capite de apoplexia
 descriptum, infundito. Sed si malū incoepe-
 rit, gargarizationes propinato ex syrupo a-
 cido, qui aceto saccharo & aqua potabili, prę-
 parat, vel ex hydromelite & pipere, & oxy-
 melite. Temporis vero successu ex muria
 Nabathę, hydromelite & sinapi, collutiōes
 administrato. Ex eorum genere, quę ma-
 lignis anginis, post aliorū & retrahentium
 & euacuantium vsum, auxilium præstant,

G sunt,

A pituita
 so succo.

Sūme pe-
 riculosā
 aginz cū-
 ratio.

PARA IN NONVM

† Alibi
cum

Hæc om
nia inter
initia, vi
tare oportet.

sunt & sanguinis ex venis sub lingua latissimis imminutio, & cucurbitulæ, † sine cutis incisione, collo affixæ. Sunt præterea collo applicanda fomenta humida, ex melle quod anacardinum supra appellauimus, idq; tantisper, dum vesiculæ excitentur. Sic quoque ad eundem vsum, ex sinapi gargarizatio, vtiliter exhibetur. Faucibus autem subsequenter puluerem inspirato. Qui accipit, salis ammoniaci, pyrethri, nitri, succi Cyrenaici, mentastri, partes aliquot, & hæc in puluerem detrita, faucibus insusflato, aut cum hydromelite gargarizationis loco porrigito.



De tussi. Caput. lv.

A calid.
& sic.

Cum tussis aspera & arida cum rubre castuq; molesta est, laboranti aqua cui violæ immaceratæ sunt, cuiq; saccharum in condimentum adiectum sit, & pūsana propinabuntur, fabas quoq; excorticatas & spinachiam vocatam herbam, cum oleo amygdalarum dulcium, inter cibos assumet. Aquæ autem, quæ potui porrigetur, violaceus syrupus conmiscendus est. In ore vero sub lingua æger retinebit globulos, qui quum ad pellendam tussim

fin

RHAAZAE DE MORCVR. .5c.

sim faciunt, a Græcis *Βήχικοι* appellantur.
 Quorum compositio hæc est. Succis dulcis ra-
 dicis, sacchari albi vtriusq; drachmę decem;
 amyli, tragacanthę, amygdalarum dulcium
 cortice liberatarũ singulorum drachmę quĩ-
 que, hæc nucleorum cotoneorum cremore ex-
 cepta, in globulos redigito. At industrium es-
 se oportet eum, qui medicamentum linguę
 subiicit, vt paulatim eo liquescente, larynx id
 quod in eam defluit excipiat, quod tussi resi-
 stens optime curabit. Porro si tussi præ-
 sens glutinosi sputi copia expuitioni conu-
 max; noxam inferat, quę tamen feбри & ve-
 hementi alui solutione vacat; subsequentes
 pastilli infirmo propinandi erunt. Qui con-
 stāt, seminis foeniculi, seminis apij, succi dul-
 cis radicis, adianti, amygdalarum amararũ;
 singulorum æquis portionibus, hæc simul
 lini seminis succo excepta, in pastillos dige-
 runtur, quorum denarij tres offeruntur. De
 coctum vero, quo in proposito affectu vti-
 mur, quoq; iā cōprehensos pastillos læuiga-
 m⁹, capite q̄ distillationis subsidia scribunt
 tur, preceptum est, illi tamē drachmę quĩq;

A pituitę
copia;

PARA. IN NONVM

adianti, et hyssopi momentū opportune adhi-
tetur. Si vero eo vetustatis, & malicie tussis
deuenerit, vt laborantem vigilijs excru-
ciet, globuli ex syraxe illi porrigendi sunt.
Qui recipiunt myrrhæ, syraxis, opij, singu-
lorum pares portiones, singuntur ex his glo-
buli lupinorum instar, & horum vnus, aut
alter ore sub lingua retinendus, (vt eliques-
cēs deuorari queat) offertur. Aut quum ab
huiusmodi globulis abstinetur, dormitu-
ro agro syrupi papaueris vncia, vel albi pa-
paueris semen cum saccharo, ad manducan-
dum, præbetur. Is autem qui hoc malo corri-
pitur, ab omni acidorum, salforum, austerorū
acriumq; esu, coarcendus est. Suffumigatio
ad veterem tussim foetidaq; sputa efficax. Su-
mito aristolochiæ, myrrhæ, syraxis, galbani
singulorum pares modos, auripigmenti ru-
bri quantum omnia pendent, hæc in pulue-
rem subacta, butyro vaccino subigito, ac ex
eis probe mazas pilæ instar, confingito, &
quum vsus exigerit, ieiuno agro harum va-
nam carbonibus superpositam, per infumi-
bulum suffito.

7. secūdu
locos ha-
bes gene-
rosū dia-
codyon.

Mirifice
exiccat.

RHAZAEDEMORCVR. .41.

¶ De difficultate spirandi, quā Græci & ὀδύνα
appellant. Caput. lvi.

DVm quis crebra tussi correptus, fræ-
quenter respirat, quemadmodum so-
lent citatiore cursu, aut vehementi exercitio
fatigati, & quando supinus decumbit gra-
ui⁹, dū vero recta ceruice sedet, min⁹ affici-
tur, subscriptum decoctum illi propinandū
est. Accipit autem ficuum caricarum drach-
mas decem, palmularum pinguium ac recē-
tium, seminis apij, seminis foeniculi, adian-
ti, dulcis radicis, hyssopi, marubij singulo-
rum drachmas quinque, incoquantur simul
tribus libris aquæ dulcis ad duarum libra-
rum euaporationem, & deinde percolantur.
Huius decocti iuris suspiriosus triduo vn-
cias quinque bibet, adiectis interim subscri-
ptæ confectionis drachmis tribus, quæ ad
hunc modum se habet. Dulcis radicis suc-
ci, hyssopi, adianti, singulorum drachmæ
decem, cardamomi, piperis, amygdalarum
amararum, aristolochiæ rotundæ, seminis
urticæ singulorum drachmæ quinque, mel-
lis despumati quod satis est. Confectio

A glutino-
sa pitu-
ita pul-
mōis me-
atibus im-
pacta.

hec

P A R A. I N N O N V M.

hæc efficiendis e thorace recrementis, præparatissima est, quocirca septimana vna continuo vtiliter æger ea utetur. Deinde post sinapis & mellis esum, vomitus irritandus est, aliisque catapotijs his ducenda. Accipiunt autem, agarici quantum pendent hordei grana octodecim, cucurbitæ sylvestris carnis grana sex, succi cucumeris asinini quantum pendent hordei grana quatuor, dulcis radicis succi sesquidrachmam, finguntur ex his catapotia, quæ vni propinationi sufficiunt. Post hæc decoctum vna cum confectiōis usu repetendum est. Postremo vomitum quoque & ventris deiectionem reiterare conuenit. Et hæc vniuersa quoad sanitati æger restitutus, sunt tentanda, interim vero, a crassorum & acidorum & austerorum esu, ægrotus diligenter arcendus est.

¶ De laterali dolore, qui πλευρίτις Græcis dicitur. Caput. Ivi.

Cum quis in membrana costas succingente, dolore punctili laborat, præcipue si tussis sicca & febris illum concomiteatur, competit, si dolor qui a summa humerorum compage ad extremas earum costa-

rum cartilaginea est, usque ad claviculam peruenit, sanguinem ex axilla
 lari eius partis, quam dolor infestat, minuere, nisi forte vniuersum corpus sanguine plenum plethoricum fuerit. Tunc enim ex latere opposito sanguinis detractio, non minori comodo celebrabitur. Porro si morbus ad dies aliquot aegrum adfluxerit, fluxusque constiterit, sanguis missus ex cubito affecti lateris, et eorum sequaces, quos etiam remedio est. Si autem ad inferiora costarum intervalla circa hypochondria dolor descenderit, alius decocto, cap. de distillatione comprehenso, ducenda erit. Ceterum veriti turbatione, quam purgatio accersere solet, praestabit venam incidere, deinde hordei decoctum cui saccharum admixtum sit, in potum pinare. Quod si tussis admodum arida sit, mane singulis diebus iuleb violatum (Graecis iozulapon appellatum) porriges. Eius autem mixtura est huiusmodi. Violarum vnciae tres, in tribus sextariis aquae per diem macerantur, excolaturque aquae, librae tres sacchari adijciuntur. Deinceps vero hordei decoctum aegrotanti non inutiliter prebebis.

PARA. IN NONVM

Et si ægri vires deiectę fuerint, pane modice fermentato, ac quam minime salso, frigidaq; abluto, simul cum saccharo eum cibabis. Robustis autem viribus, hordei ius vsq; ad diē quartum sufficiet. Vbi vero iam sputa deijcere egrotans cœperit, decocto ad distillationes curandas a me composito, perpetuo ante hordei decocti potum, donec restituatur eger vteris. Porro si febris, vehemētiaq; morbi p̄seuerauerint, atq; ægre sputa educere egrotus valuerit, decoctū capite de respirandi difficultate descriptum, præbebis. Quod etiam dū eger saniem expuet, utiliter administra- bis. Ceterum si inter morbi initia sputa valde nigra flauaque apparuerint, & ita continuata fuerint, et neq; febris, neq; calor ante septimū diem se remiserint, haudquaquā affectus timore vacat. Præterea si præter hæc, eadem spirandi difficultas permaneat, & simul audiatur in thoracis cauitate murmur aliquot, similiter si genę ac oculi multo rubore suffunduntur ac dolent, affectus in maturam mortem præcipitat. Quod si lateris parte exteriori, rubor aliquis suffusus, tu-

Notha
pleuriti-
dis cura
fig.

morue conspiciatur, & locus affectus tactu
indolecat, ad cucurbitularū vsum (ante sum-
ma cute leniter incisa) properandum est. Aut
emplastrum ex sinapi & ficubus recte, do-
nec modice locum exulceret, imponetur. Pri-
us tamē opportuna venæ sectione, aut purga-
tione, quæ huic malo idonea esse posset, &
humoris affluxi leni resolutione, tentatis.
Sane ex imperitorū Medicorum hallucina-
tione, multa huic malo accidūt augmenta, ve-
luti quum in mēbrana costas ambiente, cras-
sos flatus infarctos coniecturantes, confectio-
nem diamoschum appellatam, aut huic in di-
scutiendo & incidendo vīribus parem, por-
rigunt, qua ratione medicandi, ægrum plane
iugulant. Affectus porro, qui in spurias
costas integente membrana, ex inflammatio-
ne oboritur, Arabibus Persica dictione bir-
sen (quasi thoracis noxa) dictus est.

¶ De pulmonum inflammatione, quæ πνευ-
μωνία Græcis dicitur. Ca. lviij.

Q Vando hominem febris ardens cor-
ripit, tantaq; inter spirandum diffi-
cultas oboritur, ut se strangulari existimet,
&

P A R A. I N N O N V M

& quum tanto rubore malæ suffusæ sunt, ut tinctæ videri possint, ac dum thoracis parte anteriori grauitas, & tussis, et pectoris distētio (tamen absque dolore punctili) premunt, quodq; per sputa deijcitur spumosum ē, is æger, si omnia concomitentur, valentem ac acutam pulmonis inflammationem suffert. Quod si pelliculæ ipsius, quæ cum thorace secundum ipsius longitudinem sunt connexæ, sint inflammatæ, etiam dolorem punctilem æger percipit. In curationis itaq; initio e vena axillari — dextra — sanguinis detractio prodest — Nam sola ratione plethoriæ, vena pertusa, in hoc affectu iuuat. Nihil enī a pulmonibus cordisq; dextro ventriculo venæ sectione eluci posse, membranarū dextrī ventriculi cordis, anatomica administratio apparēter demonstrat — Deinde post venæ sectionē reliqua curatio tentanda est, iisdem, quibus pleuritidi medemur.

¶ De cruentis ac purulentis expuitionibus
Caput. lix.

Sanguis si sreatu, aut paucio strepitu, quā absq; tussi est, educitur, nullus erit inde ægro

Adhuc in
venis, cu
bunt p
tunc mal
sunt.

Ex aut
luc.

egro metus, siquidem gargarizationibus capere ad anginam præceptis, & ratione vitius tenuiori, sanari poterit.

Vomitu Ex vtriculo

quod si erumpat sanguis, nec inde ingens egro formido incuti debet. Venæ sectione namque, & astringentium usu, quale omphacinum est, & rhus obsoniorum, atq; his persimilibus, persanari hoc vitij genus poterit. Sumito itaque lapidis Armenij, gummi Arabici, balaustiorum, cinnabaris, thuris omnium equalia pondera, & horum drachmas tres simplici discocto cydoniorum succo subactas, proponito.

A quibusdam vero sanguis, per circuitus quosdam, expui consuevit, unde non modo nulla noxa illis imminet, verum etiam id valetudini multum prodest. Proinde is minime suppressendus putatur.

Sin autem cum tussi, sanguis prorumpat, non immerito formido nos occupat, nihilominus tamen, egri curatione, venæ axillaris sectione incipies, partita interī sanguinis missione Deinde subscriptos pastillos potui porriges. Qui cōstāt, thuris, cinnabaris, vtriusq; drachmis tribus et scrupulo vno

&

PARA. IN. NON. V. M.

¶ Carent
noſtre of
ſicinz.

succini drachmis quinque, lapidis hematitis,
 ⁊ terræ sigillatæ viriusq; drachmis decē, a-
 luminis drachmis duabus cum semisse, ba-
 laustiorum drachmis tribus, opij drachmis
 duabus, rheobarbari Seni tantundem, ex his
 portulacæ succo aspersis, informantur decem
 pastilli, quorum quotidie vnum succo ocimi
 maioris, aut portulacæ leuigatum, propina-
 bis. At si vehementior morbus extiterit, san-
 guinisq; eruptio incrudescit, alterum pastil-
 lum, egro somnum inituro, porriges. Crura
 quoq; circa iugina, & brachia ad scoptulas,
 aut potius in tenuioribus partibus (vt pote
 magis nervosis & dolorificis) vinculis in-
 tercipito, ac vna summas extremasq; partes
 ad reuellendum sanguinē, infricato. Pectus
 quoq; præcipue si dolore quopiam iritetur,
 epithematibus ex paulo ante comprehensis
 pastillis, aceto & aqua subactis, preparatis,
 crebro illinendum est. Aegri quidem cibus,
 rhus obsoniorum & omphacinum, eisq; psi-
 milia admisceto, & ⁊ terram sigillatam in-
 terpositis intervallis commanducandā præ-
 beto. Inter decubitus autem, supinus, ac p-

¶ nos lapi
de arme
ni oportu
lacæ suc-
co marce-
rato vte-
mur.

permodum (absq̃ dolore tamen) erectus, maxime necessarius, ac perquam utilis est.

¶ De tabe quæ & Diors Græcis dicitur. Ca. lx.

SI quis partium colliquationem a tussi, quæ ex diuturno morbo sit, aut post crebra cruenta sputa, aut multas puris reiectiones patitur, illi lac asininū vtiliter potandū porriges, ac si eius facultas non detur, caprinum, cui sacchari momentum commixtū sit, offerro. Quod etiam posteaquam aliquid panis illi adieceris, ægro esui dabis. Quin etiā si huiuscemodī generis lacte capiit, illud quoq̃ aque loco, q̃ties sitit, propinabis. Interdū tñ tenue ac tēperatū vinū potandū exhibebis. Cibū vero ex auiū, & hoedorū carnibus administrabis. Aegrotus præterea ieiun⁹ & a cibo, balneo haudquaq̃ calido, sed tepēte vtatur, solioq̃ dulcis aque, diutius sine periculo immorabitur. Et inter cetera, ne aluus fluat turbeturue, diligenter præcauere eger debet. Si quidē soluta fuerit, huius pulueris potu cōstringetur. Accipit autē gummi Arabici, lapidis Armenij, seminis myrti singulorum partes æquales, subiguntur oīa

Proprie
pulmo
nū ē exul
ceratio.

P A R A . I N . N O N V M

in puluerē, et eius vno die drach. tres cū sy-
rupō albi papaueris, & myrti succo discocto
exhibent. Hic puluis ad hūc modū in potu
administratus eos qui tussi, & cita aluo labo-
rant, strenue iuuat. Verum huic interdū, vt
maiorē astringendī vim obtineat, vtiliter ad-
ijciuntur ꝛ xylocaractæ ex Syriā, & bdelliū
ex Mecha. Porro si e lactis vsu, in febrim æ-
ger rapiatur, ptisana pota subtracto lacte be-
ne facit. Verū febre conquiescente, ad lactis
vsum rursus pperandū. Si aut denuo febris
molestauerit, lac fugiendū est, & ptisana quo-
usq; febris abigatur offerenda, qua iterū pro-
pulsā, lactis vsus repetitus prodest. Hæc q̃
diu necessitas vrget, quadā vicissitudine sunt
faciēda. Interea vero summo studio, ne alu²
lubrica fluat, prospiciendum.

¶ De cordis palpitatione. Caput. lxi.

A calida
ocasiōe.

¶ Subse-
quētib;
capitibus
nostrates

SI febris pulsusq; velox cordis tremorē
cōcomitāt, egro axillari dextra secta, san-
guinē detrahito, & potui pastillos ex cāpho-
ra, succo malorū puniceorū acidorū leuigatos
præbeto. Hi accipiūt ꝛ spodū, seminis cucu-
meris citrinati, intybi, lactuæ, portulacæ, ro-
sæ

farum, sandali albi omnium æquas portiones,
 & horum singulis drachmis, adijcito cam-
 phorę pondus trium granorum hordei, ac
 his omnibus malorum syluestrium succo de-
 tritis, informato pastillos, & eorum quoti-
 die duabus septimanis continuis, drachmā
 vnam malorum syluestrium succo detrita,
 in potu porrigito. Porro si hæc medicina
 morbo cesserit, lac ex quo butyrum pressum
est, ne forte continuus pastillorum vsus no-
ceat, potui præbeto. Alimenta vero erunt,
 pulli ex aceto, & vuae immaturæ succo, aut
 alio quopiam acido condimento elixi. Syru-
 pus quoque acidus appellatus, qui ex saccha-
 ro apparatus sit, potui vtiliter dat. At si cor-
 dis palpitatio, febris vacat, ex moscho compo-
 sitos pastillos, in potu offeres. Qui recipi-
 unt mastiches, spicæ, ligni aloës, cinnamo-
 mi, caryophyllorū, galliæ moschatę, nucis my-
 risticę ꝓ cubebe, cardamomi maioris & mi-
 noris, corticis citri singulorum sesquidrach-
 mam, moschi obolum, his vino odore asper-
 sis, informato pastillos, qui syncopi ac cor-
 dis palpitationi strenue auxiliantur.

officium
 ebur
 busti
 cipium

A frigida

† Nō cō-
 stat inter
 se Arabes
 nos sub
 o nomi-
 semina-
 cria ha-
 mus.

Elect

P A R A . I N N O N V M

¶ Nostri
offici
marum se
men pro
posito
non ē in
utile.

Electuarium ex moscho sumptuosum, de-
fectui animi, tristitię, cordis palpitatiōi &
fastidio vtilissimum. Mastiches, cinnamo-
mi, seminis ocimi maioris, seminis ocimi ci-
trinati, seminis melissę, seminis sisymbrię,
seminis sampsuchi, piperis longi singulorū
par pondus, ex his omnibus in puluerem
reductis, drachmę decem sumuntur, marga-
ritarum comminutarum, coralli rubri, cu-
bebe, bombycis crudę hoc est, nondum in
filum contortę intextęq; succini, been albi
& rubri, foliū Gręcis *μαλάβατρον* dicti singu-
lorum quoque drachmę decem, moschi Tu-
babetici syncerioris sedrachma, omnia hæc
cremore maceratarum myrobalanorum che-
bularum excipito. Hoc sane electuariū ven-
triculi frigiditati, ac cōcoctricis imbecilli-
tati, mirum in modum prodest.

A biliosi
umoris
copia.

¶ De cholera morbo.

Capit. lxii.

Quando dolor punctilis atque ero-
dens, tormina, & nausea aliquē in-
uadunt, & si his adsint, aut subsequantur
vomitus, & ventris per inferiora turbatio,
aqua modice inferuefacta copiosissima cre-
bro

bro

bro propinari debet, deinde vomere oportet,
 digito, aut pinna ori indita. Item alui ductio-
 ne adiuuandus est stomachus. Sin autem vo-
 mitus, & alui fluor nō conquieuerint, ad tea-
 pentem aquā rursus confugiendū est, bilioso
 enim humore circūcirca adhærente, vna cū
 aqua reiecto, stomachus elotus, ac leuior red-
 ditus, oblatū sibi cibū retinet. Quocirca vbi
 morbus remitti cœperit, æger in balneū po-
 tabilis aquæ deducatur, cui vnus horæ spa-
 tium, aut pro viriū robore, immoretur. Egresso
 autem balneo, & cibis concoctu facilibus, vt
 carniū expresso, & vino subastringēte enu-
 tritus, ac præcordijs oleo ad id idoneo perun-
 ctis, somnū arcersire debet. Et licet immo-
 dica ventriculi perturbatio, supra infraq; ac
 reliqua grauiā symptomata superueniāt, nō
 ideo animus adiciendus erit, quin potius me-
 dicinis subsequētib⁹ malo auxiliū ferēdū ē.
 Initio itaque pastilli ex thure, aqua, aut ni-
 ue & malorū punīcorū discocto succo laxi-
 gati, semel propinandi sunt. Qui si vomitus
 ingruerit, secūdo quoq; porrigēt. At hæc ex-
 tremas q; brachiorū, & femorū partes cit-

Relicto
 morbo,
 symptomata
 curatio.

PARA. IN NONVM.

Paul^{us} h^{ec}
calida sic
ti p^{re}cepit.

ca inguina, vinciri oportet. Preterea aqua ni
ue infrigidata, crurib^{us}, & pedibus ab alto
instillare, ac etiã in gelidã aquã descẽdere il
licq^{ue} imorari, strenue auxiliat^{ur}. Vēter porro
epithematis, quę sandalis, rosas, cāphora, gal
lia moschata, simul rosarū aqua aspersis, cō
ficiuntur, irrorandus est. Confert item lin
teum aqua rosarum niue refrigerata imer
sum, si ventri apponatur, quod vbi tepue
rit, ne cōcalesfactum noceat, abijcietur, & al
liud in eius locum superaccommodabitur.
Aut cataplasma ex palmulis cum vitis agre
stis floribus & acacia, item hypocistidis &
mali punici succo, est inducẽdū. Porro pau
latim vinum vetus decoctio malorum puni
corum succo contemperatum, propinabi
tur. Et quotiescunq^{ue} eger euomuerit, toti
es aliud, post modicum interuallum, effere
mus. Cibus autem panis malorum punico
rum succo maceratus, vna cū vino subastin
gente erit, quem si vomitu etuctet, rursus
quousque vomitus sedetur, panem porrigẽ
mus. Si vero animi deliquio cū ingentem e
tiacuationem, eger corripitur, moschū hor
de

dei grani instar, vino leuigatū dare prodest.
 Proinde si os clausum teneat, vi apiendū est,
 & vinū infundēdum. Sic quoq; hœdorū &
 pullorū carniū expressum, & mali cydonij
 succus, vino cōmixta, vtiliter porriguntur.
 Præter hæc, ante egri nares allos pullos dis-
 cerpere iuuat, si modo carniū vaporem non
 abhorreat. Thus quoq; ad ventriculi reten-
 tricem facultatē corroborandā, ore cōmandu-
 candū, vt paulatim eger id trāsglutiat, dādū
 ē. Postremo; bol⁹ Coracesi⁹ cāphora cōdit⁹,
 et in puluerē adamussim trit⁹, atq; cū astrin-
 gēte vino porrect⁹ iuuat. At oībus, quę huic
 malo cōmoda p̄cepimus p̄sidijs, donec vo-
 mit⁹ cesset, vētriculusq; alimētū sentiat, erit
 insistendū. Postq̄ vero vētricul⁹ cibū ample-
 cti cœpit, cibādus eger ē, et modicū vini ve-
 teris, ac odorī potui porrigendū, sōnusq; ad
 restituēdas vires, cōciliād⁹. Pastilli ex thure,
 vomitui sacri. Boli ꝑ Coracesij, thuris āborū
 drach. x. ꝑ cubebe, cardamomi vtriūsq; drac.
 duę cū semisse, cāphorę, gallię moschate, cary-
 ophylos; singulorū obol⁹ informato pastillos
 pōdere sesgdrachmæ ad vomitum efficaces.

Plini. vt
 opinor,
 Tauri lyg-
 dinū lapī
 dē vocat.

¶ Nos nō
 stro arme-
 rio. et ac-
 cri semig
 vtemur.

P A R A. I N N O N V M.

Decoctione quidem mali punici succum
 Incrassatū, ad hunc modū apparabis. Sumito
 malorū punicorū acidorū succum, ac per no-
 ctē, pauloue amplius, quod crassum est, in fū-
 dum residere finito, deinde tantisper dū mul-
 ti spissitudinem accipiat, decoquito, & dili-
 genter spumam detrahitō, ac dein ab igni re-
 moto (tamen adhuc calenti) menthæ viridis
 coliculos inijcito, eosq; cum succus iā refrige-
 ratus est, extrahito. Ad huius formā cydoni-
 orum malorum, & malorū sylvestriū acido-
 rum syrupos fieri decet. Si autē vomitus
 aliquoties inualuerit, proruperitq; cucurbi-
 ta magna cū multa flāma, ori ventriculi affi-
 xa, ac vi abstracta, eaq; secundo ac tertio ag-
 glutinata, plurimum egro auxiliatur.

¶ De uentriculi imbecillitate. Cap. lxxiii.

Ob frig.
 ei diste-
 periem.

Ventriculi imbecillitas si cum modica
 siti, & longa cibi in ventriculo mora,
 ructibusq; acidis, agrū affligit, & sympto-
 mata hæc pauca, neq; admodū vetera sint, vē-
 triculus pastillis ex rosis confectis, sanitati
 restituetur. Quorum æger singulis diebus
 mane denarios duos, & totidem obolos, cū

vnci

yncia seminū incidentiū decocto dissolutos,
 deuorabit. Seminū aut decoctum in hūc mo-
 dum preparatur. Cumini Nabathę & am-
 meos vtriūsq; drachmæ duæ, in mīna aquæ
 tantisper dum ea rubescit incoquuntur, de
 qua deinde cum pastillis ex rosis ægro mē-
 sura supra comprehensa propinatur. Pastilli
 vero ex rosis accipiunt, pulueris rosarum ru-
 brarum drachmas tres, ligni aloës, spicę ma-
 stiches, casiaę ligneaę, iunci odorati, cinnamo-
 mi, ablinthij singulorum drachmam vnam,
 hæc vino veteri conspersa, in pastillos redi-
 guntur. Verum interim æger alendus est, ci-
 bis q̄ minimum humectantibus, & concoctu
 facilibus, parumq; excrementitjs, ex quorū
 genere pulmenta aromatibus & odoratis
 incidentibusq; seminibus preparata, & aliq̄
 qui simul & calefaciunt & incidunt cibi,
 sunt. Aegrotanti præterea, ante cibum mul-
 ta exercitatio, minorq; solito aquæ frigidaę
 vsus, & postq; cibus in ventriculi fundū de-
 scenderit, profundus somnus, illito prius vē-
 tre oleo nardino, magis iuuat. Vino autē
 veteri & mero parce, ne cibus in ventriculo
 fluctu.

PARA. IN NONVM

A maior
si causa.

fluctuet, vter. atq; omnino vict⁹ rationne ex
cenuabit. Qd si hæc symptomata iueteraue
rit in crudueritq; electuarij ex cumino & ele
ctuarij ex thure vtriusq; sesquidrachma, cū vn
cia vini veteris ac meri diluta, recte exhibe
bit, & victus ratio eadē cū paulo ante præ
scripta instituetur. Electuarium ex cumino,
Cumini Carmaniani drachmæ cētū, zingi
beris drachmæ viginti, piperis drachmæ de
cem, foliorū rutæ, nitri naturalis & integrio
ris vtriusq; drachmæ decē, omnia despumato
melle excipito, & huius antidoti, si alius
non respōdeat, portionē aliquam porrigito.
Sin autem cira sit, electuatium ex thure præ
beto, cuius compositio infra capite de vētris
profluuiō describitur. Porro si hæc ineffica
cia fuerint, ferri recrementū vino leuigatum,
aut potius quæ ex eo est, compositionem da
to. Præparabis quidem stercoris ferri cōpo
sitionem, ad hunc modum. Seminis apñ, se
minis fœniculi, anisi, cumini, ammeos, y a
niuden, origani, ligustici, cari, seminis coriā
dri, piperis nigri, piperis longi, cinnamomi,
thuris, spice, caryophylorum, nucis myristi
cæ,

Galibi al.
Si additur

Arbor
apud A
ui. sub no.
leaste,
hanc

ꝥa, cyperi, zingiberis singulorū ſesquidrach-
 ma, ſtercoris ferri drach. quindecim, omni-
 bus vini centuplum addito, & ad dimidi-
 as decoquito percolatoqꝫ. Eius percolati me-
 dicamenti ægrotanti drachmas triginta ex
 vino adminiſtrato, ac vna victus rationem
 tenuiorem inſtituito. Hæc tribus ſeptima-
 nis commodè repetuntur, & rectè ab aci-
 diſ & recentioribus fructibus, & frigida
 aquæ potu, abſtinetur, vinumque modera-
 te vtiliter propinatur. Cataplaſma ad
 ventriculum calefaciendum corroborandum
 que multum efficax. Sumito ſtyracem, ſpi-
 cam, iuncum rotundum, abſinthium, cala-
 mum aromaticum, maſtichen, & ea vino ve-
 teri & cydoniorū ſucco aſperſa, in cataplaſma
 ventriculo ſuperinducendum, dirigit. Ad
 hæc optime facit ventriculo ex oleo nardino
 & cyprino frictio illinitioqꝫ. Quinetiam
 & lana ſuccida prædicto oleo tepente imbu-
 ta, linteoque ventriculo ſuperligata multum
 iuuat. Potui autem ægrotanti vinum ve-
 tus calidumqꝫ, aut hydromel propinabi-
 tur. Ieiuno vero ægro, aut ſaltem tribus
 horis,

P A R A. I N. N O N V. M

horis ante cibū, diacydoniū (Arabibus mīua
appellatū) mediocris mystri modo dādū est.
Apparatur autē ex malis cotoneis pharmacū
hoc modo. Ex malis cotoneis maicra iucun-
dioraq; & minus acerba, quæ videlicet strū-
thia appellantur, eligito, expressumq; eorū
succū, diē & noctē totā, quo resideat relinque,
deinde eo percolato, ex puriore succo partes
duas semito, sacchari partē vnā, vini veteris
vnā & lente supra prunas, donec mellis spis-
situdinē recipiant decoquito (hac enim cras-
situdine stomachica medicamēta præparari
solent) deinde spumā diligenter aufero. Po-
stea ad singulas totius libras accipies, zingi-
beris, spicē, cinnamomi, caryophylorum sin-
gulorum drachmā vnā, mastiches drachmas
duas, quæ oīa in puluerem tenuissimū detri-
ta, lineoq; panno illigata, adhuc feruēti de-
cocto, iniicies, & quum a prunis amotū refri-
xerit, linteum diligēter expressum eximes,
ac medicamen ad hunc modum vsui futuro
recondes. Quod si concoctionis offensæ
adsint, cibi fastidium & nidorosi oletosique
ructus, vocatum cotoneorum malorum aci-
dum

Gale. &
Alex. pul-
ueres in-
ficiūt.

A calida
intēpe-
rat,

RHAAE DE MOR. CVR. .61.

dum syrupū propinabis, quē ad hunc modū
 cōficies. Succī cotoneorū acidorū pars vna,
 sacchari albi totidem, aceti albi ac perlucidi
 quarta pars, oīa simul tantisper dum iustam
 spissitudinem obtineant, decoques. Sane hic
 syrupus ventriculum corroborat, & præter
 q̃ quod eius munia ad actionem excitat, ve
 hementē quoq; eius inflammationē, & estū
 mirifice reprimīt. Aegro autem cibus, qui
 simul & acidus, ac austerus sit, præparabit̃,
 cuius generis est caro cum immaturarū vua
 rum & malorum syluestrium acidorū ex- † Nos de
 cetosa vo
 cara her
 ba vte
 mur.
 presso, & ribes decocta, & columbæ quo
q; ventrē mētha infartum habentes, cū mo-
mento salis & omphacino decoctæ, aliaque
aciditate & austeritate his correspondētia,
alimenta sunt. Præterea pulvis hic crebro
 sumendus offertur. Qui accipit, rosarum ru
 brarum drachmas decem, spodij drachmas
 tres, seminis coriandri drachmas quinque. hu
 ius pulueris drachmę duę succo malorū pu
 nicorum acidorum, & syrupo acido cydoni
 orum insparsæ porrigunt̃. Ceterū si pau
 o ante dictis symptomatibus corporis ma
 cies

A sicca
 & calida
 itēperie.

P A R A . I N N O N N V M .

cies inflammatioq; adsint, laboranti lac & hordei decoctū ppinet, ac herbis humectantib⁹ refrigerantibusq; ex q^{ru} g^{ne} lactuce, malue, cucurbite & citrinati cucumeres sunt, æger enutriet, nō nimis liberaliter tñ. Iā etiā hædorū et lactantiū agnorū carnes, et recentes in petrosis aquis degētes pisces, egro ex usu sunt. Ad hæc balneū ieiunus, et a cibo cōscendat, eiq; ad tēpus immoret, aut in dulcis aque tepētis folio indies desideat. Vinū etiā plucidū & perq; dilutū bibat, ac subide geti se det, motūq; oēm et exercitiū fugiat. In sūma victus rō, ac reliquū viuendi genus tale sit, qd' obesitatē pariat. Sed si hūc affectū inflammatio, æstusq; vehemētissimus cōcomitetur, vētriculo refrigerantibus inunctionibus, vt oleo quod immaturæ vuæ fuderunt, & melino, atq; violacei momēto, succurres, & hordei decoctum potui præbebis, ægroatīq; eandem medendī rationem cum hectica febrī correptis, institues.

Ab itē
re intēpe
rie,

¶ De oris vētriculi dolore, ac inflāmatioe. C. lxxiii.

SI oris ventriculi dolorem, eiusdem subuersio, & erosio nauseaq; subsequantur ægro,

agro liberaliori aqua modice inferuefacta Absq; in
 porrecta, vt vomat (digito, aut pinna oleo ma flā. a calio
 dente, in fauces inserta) præcipiemus. Cete do humo
 rū si hoc inualidū fuerit, aluus hiera picra, vt re.
 in ventriculi tunicis impactū succū expur-
 gemus, ducenda est. Accipit aut amarū hoc
 medicamē, pulueris rosarū rubrarū, spice, ma Differt a
 stiches, ligni balsami, fructus balsami, cinna Gal. 7. me
 momi, cassiæ ligneæ, asari singulorū drach. thodi.
 quinq; aloës rufi coloris iocinorisq; modo
 cōcreti duplū oīm, quod diligenter detritū,
 alijs simplicibus medicaminibus læuiga-
 tis, & incerniculo ex tenuissimis setis, aut
 serico constructo, cribratis, commiscetur,
 atque rursus omnia simul cum aloë con-
 teruntur. Huius autem quantitas, ab au-
 reis duobus ad denarios duos vsque, offert.
 Laborātī quoq; quotidie panē vino austero,
 & mali punici succo supra descripto, cotone
 orūq; acidorū syrupo, maceratū, præbeto. Si Ob frigi
 aut dolori acidorum & flatuosorū ructuū co dū succū
 pia ventriculique distentio, ac singultus af- & flatus.
 fuerint, exhibeto electuarium diacymi-
 num, & diacalamenthēs, & alia consimilia,
 quibus

PARA. IN NONNUM

quibus discutiendi vis adest, quæ capite de
 intestini laxioris vitij præsijs persequar.
 Cibi autem ægri erunt pulmenta aromati-
 bus & calefacientibus seminibus apparatus.
 Potui quidem pauxillum vini veteris et
 meri propinabitur. Exercitia quoq; & me-
 dicamentosa rû aquarû balnea nō mediocri-
 ter iuvant. Quinetiā ventriculum penicil-
 lo nardino oleo, aut quopiam alio calefacien-
 te, & subalstringente, imbuto, fouere condu-
 cit. Porro si oris ventriculi dolorē, febris
 vna cum manifestæ inflammatiōis indicijs,
 et estu, q tactu deiudicari possit, subsequant̃,
 mox inter curationis initia, axillari dex-
 secta, sanguinē detrahito, & dolenti loco san-
 dala, rosas & camphorā, simul rosarum a-
 qua, & cotoneorum succo læuigata, superaco-
 commodato. Aegro vero præter pisanā nul-
 lum cibum offerre debes, pinde a carniū
 esu, & cōpositiōibus ex melle cōfectis in-
 primis arcendus est. At corroborandi gra-
 tia, interdum malorū punicorum acidorum
 succum, & eum qui ex reliquis fructibus frī-
 gidam & astringentem vim possidentibus,

Cū inflam-
 matione.

decoqu

decoquitur, vtiliter propinabis. Siquidem inflammatio oris ventriculi & iocinoris astringētia desiderant, nam si solo relaxante praesidio curationem tentes, vitae periculum intuleris. Aestus porro vehementia remissa, cassiam fistulam intybi succo dissolutam, & simul cum eo decoctam, ac diligenter a spuma liberatam, agro cfferre conducit.

Cum vero longius morbus prorogatus fuerit, & ardor omnino quieuerit, inflammatio autem in duritiem & scirrhum decidet, emplastrum istud affecto loco superligato. Violarum aridarum drachma decem, rosarum rubrarum drachma quinque, spica odorata, massiches utriusque drachma tres, cyperi, iunci rotundi, calami aromatici cuiusque drachmae duae, farinae foenograeci drachmae viginti, florum chamamelis, seminis althaeae, hordeaceae farinae, singulorum drachmae decem, omnia seminis lini succo aspersa, in emplastri formam redigito, ac horis quatuor ante ciborum ingestionem, ventriculi regioni superinducito, ventriculo prius nardino oleo fuso. Deinde concesso & e ventriculo depul-

Scirrhi
vētri. curatio.

PARA. IN NONVM.

Oleū nar
dinū.

depulso cibo, ventriculi locus, lana nardinio
oleo immersa, vti iussi irrorandus est. Con
fectio quidem olei, seu vnguenti nardini sim
plicis, in hunc modum se habet. Olei glan
dis vnguentarię, quod proprie balaninum
dicitur, libra, spice semuncia, mastiches, co
sti, cyperi, iunci rotundi, calami aromatici
singulorum drachma vna, vniuersa hæc in
pollinem subacta, dictoq; oleo iniecta, soli
septimana vna, in vase obturato ore, expo
nuntur, & deinde percolantur. Porro fæ
ces sordesque manibus inherentes, cataplas
matibus proposito vitio dicatis, admixtæ,
plurimum iuuant. Ceterum oris ventri
culi inflāmatione in tantam vetustatem pro
tracta, vt in abscessum erūpat, pastilli ex spi
ca propinati, optime faciunt. Accipiunt
quidem hi, florum iunci rotundi, casiaę li
gneę, rheobarbari Seni, calami aromatici,
spicae cuiusq; drachmas tres, croci, myrrhe,
anisi, costi, piperis singulorum drachmam
vnā, bdellij varij drachmas tres, masti
ches drachmas duas, ammoniaci drachmam
vnā, finguntur ex his pastilli pondere ses

Abcessu
cura.

quidenarij, quorum quotidie vnus sapa detritus exhibebitur. Emplastrum ad praedictum affectum valde efficax, quod hac ratione praeparatur. Bdellij mollis drachmae decem, ammoniaci drachmae quinque, glandis vunguentariae drachmae decem, apij seminis tantundem, spicae, mastiches nigrae vtriusque drachmae quique, cerae drachmae tres, olei nardini drachmae quindecim, gummi vino subastringente diluitur, & ei omnia commixta, in emplastrum digeruntur. In ventriculi itaque & iocinoris affectibus profligandis, Medico erudito & natura sagaci, opus est, vt qui accurate ipsorum dispositiones distinguere, ac curare queat. Nihilominus quantumuis succinctus fuerim, capita & rerum summas, quae his affectibus praesidio esse possent, hoc nono libro persecutus sum.

¶ De singultu. Caput. lxiii.

Quando singultus post crassorum ciborum ingestionem, aut vini perquam diluti copiosiorē vsū, inuadit, aqua calida, cui cuminū, mētha, mētastrū et thuris pau-

Empla
strū lau-
datissimū

A flatu, et
crudo suc-
co.

PARA. IN NONVM.

emanans, pinguedinis loco cōmixta sit. Ad
hæc caudæ, & agnorum pedes, & qui his vi
scositæ & pinguedine respondent cibi, ac
commode offeruntur. Vinum quoq; vetus
quodq; impense calefaciat liberaliter (vel nō
sitienti agro) haustum optime facit. Dein-
de his deuoratis, vt ingesta euomat, & grætan-
ti præcipiendum. Ac isto curationis modo,
tantisper dum ab omni malo liberetur æger,

Ab imo
dica tran
spiratiōe
aut calido
siccō.

vt vtatur, consilium est. Sin vero a cibo
nulla molestia afficiatur, neq; per vomitum
neq; per aluum illum deiciat, carnes bubu-
læ & alia concoctu peruitacia edulia; porri-
genda sunt. Quocirca triticum pultis instar
elixum, et oryza cum lacte decocta, accōmo-
de exhibentur. Potui autem gelida aqua
detur. Quinetiam optima ratione, æger in
aëre frigidiori ac perspirabili delitescet, &
ab omni acidorum & austerorum atq; acriū
esu, abstinēbit, solisq; dulcibus ac glutinosis
cūtrietur.

Ex item
pe. aut hu-
more cali-
do

¶ De iocinoris dolore.

Caput. lxxvii.

SI decoloratus aliquis, corporis ineptum
habitu, ac dolorem dextri lateris sub

hypochondrijs, ad nothas ac posticas costas,
 comites sibi habuerit, & si color, quo suffu-
 ditur suppallidus conspicitur, magna quoque
 eris ariditas ingensque sitis agrum torqueret,
 hordei decocti ius, & herbarum infrigidan-
 tum succi, syrupo acido ex albo saccharo de-
 cocto diluti, vtiliter porrigentur. Huius au-
 tem generis herbarum, sunt intybum, sola-
 num, & amplexicaulis. A foris autem, fo-
 tus, ac aspergines ex duobus sandalis, rosa-
 rum floribus, camphora & momento spicae
 in aqua rosacea simul detritis, praeparatos,
 ad hunc modum accommodabis. Accipies
 linteam aliquod, & hoc liquore refrigeran-
 te & subastringente imbutum, loco laboran-
 ti superinduces, et priusquam tepescat, illo a-
 moto, aliud in eius locum applicabis, par-
 temque diligenter irrorabis. Potui vero ma-
 iorum puniceorum succus, ac similes decoctio-
 ne incrassati succi, facultatem refrigerandi
 obtinentes, exhibiti prosunt. Quare ager a
 vino, & his quae melle condiuntur, ac ca-
 lescentibus incidentibusque cibis, arcendus
 est. Item pastilli ex acide spinae baccis porrecti,

☿ Theo-
 phras. ii
 nodera.

P.A.R.A. I. N. N. O. N. V. M.

non mediocri auxilio sunt. Qui recipiunt,
 succi baccarum, acidæ spinæ, drachmas de-
 cem, seminis intybi, seminis cutusneris, ci-
 trinati, seminis portulacæ cuiusq; drachmas
 tres, rosarum drachmas duas, rheobarbari
 Seni drachmam vnā, spicæ sedrachmā, re-
 digito hæc in pastillos pondere drachmæ &
 semissis, atq; eorum vnum syrupo acido sac-
 charo præparato, aut malorum punicorum
 succo solutum, propinato. Alium quoque si
 necessitas vrget, succo stucium, vt pruno-
 rum & tamarindorum, ac saccharo albo, de-
 ñcito. Porro si viciatus color, iocineris
 dolorem subsequens, cū virore albicans me-
 diusq; inter colorem colliquatione laboran-
 tium partiū, & colorem tumidarū, extiterit,
 præterea si ægrotanti aluus laxa fluxerit, et
 palpebrarum, ac summārum partium tumor,
 digitorū tactui cedens, ac laxitas affuerint,
 pastilli ex rheobarbaro Seni, syrupo acido
 melle composito subacti, porrigendi sunt.
 Hi constant, mastiches, succi eupatoriū, suc-
 ci absinthij, seminis foeniculi, anisi singu-
 lorum drachmīs duabus, rheobarbari Seni
 drach

Ab itēp.
 aut mate-
 ria frigi.

Drachmis decem, digerantur in pastillos pō-
dere drachmæ vnius & semissis, atq; eorum
vnus quotidie commemorato syrupo dilut⁹,
propinabitur. Præter hæc, emplastrū ad præ-
sentem affectum efficax, ad hūc modum præ-
parabis. Accipito spicam, mastichen, cyperū,
iuncum rotū dum, calamum aromaticum, cro-
cum & myrrham, deinde myrrham vna cū
mastiche in vino odorato subigito, ac alijs
his commixtis, finge emplastrum, iocinorūq;
superinducito. Interim vero a cibis crassis,
refrigerantibus, multamq; pituitam gignen-
tibus, agrotantem arceto. At si huiuscemodi
inefficacia fuerint, pastillos ex ꝛ cācamo ra-
dicū decoctorum iure solutos, exhibebis.
Recipiunt aut pastilli ex cācamo. Cācamī,
rheobarbari Seni vtriusque drachmas tres.
spicę, seminis apri, ammeos, mastiches, iunci
rotundi, baccarum iuniperi, amygdalarum
amararum, costi amari, rubiæ satiuę, succi eu-
patōrii, asari, aristolochię rotundę, gentianę
cuiusq; sesquidrachmam, cācamo & eupa-
tōrii succo vino subactis, reliquisq; medica-
mentis illis admixtis, formantur pastilli,
pendē-

Thodiens
strates of
ficine la e
cā vocatē

Quidā
dunt sal
nam

PARA. IN NONVM.

pauillulū incocti sint, crebro in potu offerē-
da ē, & egro, vt sibi somnū cōciliet, precipiē-
dū. Vētri quoq; vesicæ, ac sacculi huiuscemo-
di decoctis seminibus, & herbis calefacienti-
bus discutiētibusq; impleti, superligādi sūt.
Quinetiam & eisdē vētricul^o opportune ir-
rigabitur. Aeger aut tenuissimo victu, eoz
incidēte, enutrietur. Cū vero plusculis dieb⁹
moderatiōri cibo agrotantē alueris, in laco-
nicū primam balnei domū subinde ipsum de-
duces. Itē insecutis aliquot diebus, illi siccā-
tia & flatus discutientia alimēta, præbebis.
e quorū albo sunt, pulmēta aromatibus semi-
nibusq; calefacientibus ac incidentibus cōdi-
ta, & assi mōtani passeruli, & pauillū vi-
ni meraci potui ei tū offerēs, ne forte vini co-
pia, cibi fluctuationē in ventriculo creet. At
si hæc non vsq; adeo valida fuerint, pastillos
ex thure porrigito. Quos ad hūc modū confi-
cies. Accipe thuris drachmas quinque, inu-
le cāpanę drachmas tres, mētastrī, foliorū ru-
the aridorū vtriusq; drachmas duas, seminis
†sisymbrii drachmas tres & semissē, his de-
critis & hyslopi succo subactis, iormato ex
illis

† alias ne-
mē hoc ē
serpilli.

illis pastillos sesquidrachma pondere, & eorum vnum in die, cumini decocto laeuigatum, propinato. Porro si singultus cum tremore, aut nausea, aut siti, aut oris summa ariditate, post febrim superuenerit, aquam modice feruēfactam, nō liberaliter, sed pedetentim, sorbendam dabis. Et si tali auxilio haud quaquam malum propellitur, aqua cui hordeum incoctum sit, vna cum oleo amygdalarum dulcium porrigenda est. Quae etiam vertebrae cetuicis & dorsi, humectante oleo tepente perungere, infricareque, non mediocriter conducit. Aegrotanti vero potus, ex herbae pulicaris seminis, & violarum, & malorum puniceorum dulcium succo, modico saccharo adiecto, parabitur. Preter haec singultui, qui ex repletione est, ac sternutationi, spiritus compressio, quae plurimum confert;

Ex sitim

¶ De canino appetitu. Cap. lxxvi.

SI quis assidua fame crucietur, & tamen cibis assumptus ita grauat, molestusque sit, ut eum mox, aut vomere, aut per inferiora deicere cogatur, oryza illi utiliter edenda corrigit, cui sanies ab agno in fornace asso-

Ab acido succo

I emā

P A R A. I N N O N V M

pendentes singuli drachmam & semmissē.
Radicum quidem ius, hac ratione præpa-
ratur. Corticum radicum apij, seminis foe-
niculi, iunci rotundi, ammeos singulorum
drachmę quinque, rosarum rubrarum drach-
mę tres, spicę odoratę tantundem, omnia
in aquę libra ad tertias bulliuntur, ac ita
decoctum ius cum commemoratis pastillis
assumitur. At si inflammatione absces-
sue iecur conflictetur, eisdem auxilijs, qui-
bus oris ventriculi inflammationi & absces-
sui medemur, illi succurrendum est.

¶ De morbo regio, qui & *intepos* dicitur.

Caput. lxxviii.

A iocino
is calore

MOrbo regio si febris affuerit, intybi,
& solani succi, & hordei decocti ius,
potui offeruntur, & cucurbitis domesticis,
atriplice, cucumeribus citrinatis, & alijs
herbis infrigidandi facultate his paribus, æ-
ger enutrietur. Iccinori vero emplastrum
inflammationem arcens, quod duobus san-
dalis conficitur, illigato, ac aluum pruno-
rum & Zamarindorum succo & saccharo
densito. Quę si minus efficacia fuerint,

Auer.
et me.
efficacina
veteribus
teognita
numerat
buliac.

pastil

pastillos ex camphora succo puniceorum ma-
lorū acidorum detritos, præbeto. Pastilli de
camphora. Sacchari, spodi, rosarum rubra-
rum cuiusque drachmæ tres, seminis inty-
bi, seminis cucumeris citrinati, seminis cu-
cubitæ, seminis lactucæ, seminis portula-
cæ, sandali rubri cuiusque drachma vna, sin-
gito ex his pastillos drachmas duas penden-
tes, & horum vnum quotidie cum cam-
phoræ obolo, aut minus pro morbi, ac vi-
rium ratione, propinato. Si æger sangui-
ne plenus, multo tempore venam non se-
cuit, vena axillari dextra pertusa, sanguinē
detrahare expedit. Quod si arquatus ci-
tra febrim contingat, aluum catapotijs his
(postquam leuiores tentaueris) recte purga-
bis. Aloës drachma vna, scammonij sesqui-
obolus, agarici scrupula duo, succi eupatorii
scrupulum vnum, hæc intybi succo excepta
in catapota dirigit, & vna dosi exhibeto.
Insuper pastillos ex cancamo, radicū inci-
dentiū decocto subactos, præbeto. Porro si
bilis suffusio in morbo regio oculos dehone-
stare nō cessauerit, æger subinde acetū acer-
rimū

A meata
ū obtura-
tione

⚡ Satisfe-
cerit dua-
bus.

rimum olfaciet, & naribus folio infidens ta-
dem attrahet, & mirifice iuuabitur, si pressis
naribus paulisper id contineat. Oculis quoque
que ictero cum febris laborantis, aqua ro-
facea instillanda est.

Non inuili-
ger i eo i-
fid. n. tia
procerap-
tur.

Præter ista aqua
to implicito, in mali declinatione, tribus
hebdomadibus lactis serum patui porrectum,
non paruum præstat auxilium.

De aqua inter cutem, quæ v. d. sw. h. i.
Græcis dicitur. Caput. lxxix.

Equitus

Cum post iocinoris dolores & febres,
abdomen intumescere coeperit, ac sur-
men (quod spatium inter umbilicum & pe-
ctinem est) prominere, & huius regionis cu-
tis extenuari, albescereque visa fuerit, & quæ
concusso abdomine talis auditur sonus, qua-
lem percussi uteri aqua non omnino pleni
elidere solent, sicque una cum his urinae ruffe
sint, parua adipiscendæ sanitatis ægro spes
reliqua est, potissimum si is virium robore
destituatur; At cui vires constant & ven-
ter quoque aridus est, carapotia ex rheobarba-
re Seni chamæleam in earum mixtura reci-
pientia, porriguntur. Habet autem huiusce
modi

modi catapotia, rheobarbari Seni, succi eu-
patori, seminis intybi cuiusque drachmas tres,
agarici drachmas quinque, chameleæ drach-
mas decem, finguntur catapotia, quæ ut plu-
rimum quantitate drachmarum; duarum
cum semisse, accommode singulis septimanis
exhibetur. Cæterum viribus prostratis, pa-
stillos ex chameleæ præbeto. Qui constant,
seminis intybi drachmis decem, chameleæ
drachma vna, agarici scrupulis duobus, succi
eupatori tantundem, rosarum † seminis cu-
cumeris citrinati vtriusque drachmis duabus
cum semisse, hæc in decem pastillos redigito,
ac eorum vnum in die syrupo acido ex sac-
charo preparato dilutum, offerro. Alio au-
tem cita profluente, pastillos ex acidæ spi-
næ baccis, syrupo acido laeuigatos, porrigi-
to. Aegrotantem præterea montanis aulcu-
lis assis enutrito, & potui succum cotoneo-
rum cum pari sacchari portione & quarta
parte aceti decoctum administrato. Verum
si alius plurimum lubrica fuerit, ut sympto-
mati occurras, impermixtum cydoniorum
malorum decoctum succum, propinato.

Suffeca-
rit, 3. 1. ci. fa

† alias nu-
cleorū cy-
doniorū.

Cete

P A' R A. I N N' O N N V M

Cæterū si a morbo vrinarū rubor, & estus,
 & cutis suppallidi coloris suffusio, absuerit,
 subsequētia catapotia magno auxilio deglu-
 tiuntur. Constant autem hæc. Chamæleæ, sa-
 gapeni vtriusq; sedrachma, sacchari, colum-
 barum ruraliū limi vtriusq; obolo vno. Lar-
 giter quidē hæc catapotia aquam ducunt, ac
 per inferiora mirifice protrudunt. Pastilli
 præterea ex cancamo, radicū incidentium e-
 lixarum iure diluti, propinandi sunt. Em-
 plastrum quod aquæ subter cutem speciei
 ἀκίτης ab utero sic dictæ, strenue auxiliat.
 Farinæ hordeaceæ, cyperi, stercoris ouilli ve-
 teris, nitri naturalis, lapidis Armenici cu-
 iusq; æque portiones, sulphuris viui momen-
 tum, quibus omnibus muria, aut aceto mul-
 so subactis, toti abdomini emplastrū adapta-
 tur, quod insigni vi, in exiccandis humorib⁹
 πονέας pollet. Ceterum si in palpebris, alijsq; sum-
 mis corporis partibus, digitorū tactui ceden-
 tes tumores (οιδήματα Græci vocāt) oborian-
 tur, & testes quoq; intumescāt, & facies vna
 cū totius corporis habitu, laxa spongiarū in-
 star, et albida pituitosaq; emortui similis ap-
 pareat

pareat, hydropis species ἀνάσκαρκα et λευκοφλαγγί-
ματις appellata, hoēm affligit. Aegro itaq;
hæc iplicito, pastillos ex cācamo radicū deco-
cto subactos, porrigo. Aliū aut ligulis septi-
manis, catapotijs ex rheobarbaro subducito.
Ad hæc, agrū sabulo arenæ excalesceta sa-
burato, ac exercitiū vehemēs, et frequens in
sole, & famē sitimq; egrotanti præscribito.

Porro si vëter inflatus, distētusq; fuerit, & τυμπαν-
cōcussus tympani crepītum ædiderit, aquæ ^{νίτης}
sub cutē speciē τυμπαννίτην dictā, adesse certū
est. Qua, q; iplicitus ē, ab oī olerū vsu, et fla-
tus gignētibus cibis, circūcidendus ē, & ab-
domē eius indies panico tosto, et momēto sa-
lis, ac surfurib⁹, sacculo isutis, fouedū. Huic
præterea cucurbitulæ leues, cū multa flāma
crebro totī vētri suffixæ, maxie p̄sunt. Qui-
etiā remedia discutiendis digerēdisq; flatib⁹
bus inscripta, et ad vrinas efficacia, eligēda
sunt, e quorum genere sunt diacymīnum,
& ex baccis lauri electuarium, quod capi-
te de ilei morbi curatione, prosequar. Dein-
de huic quoq; egrotanti, multa exercitia, et
fames ingens, strenue auxiliantur.

Sic quo

PARA. IN NON V M

Hic quoque collyria, seu glandes flatulentis spiritibus amouendis dicatae, & alia a me capite ad coli intestini vitium remedia describenda, quae maxime accommodata censeantur. Proinde clysteribus ex huiusmodi glandibus liquore quopiam detritis, vti expediet. Item ventrem etiam aspero linteo tantisper dum rubor excitetur, perfricare, & clysteres ex oleo rutaceo infundere consilium est.

Ab istam
actione.

¶ De lienis dolore. Caput. lxx.

Si Plenis dolorem si aestus, & urinae ruffe febrisque subsequantur, infra scriptorum pastillorum portionem egro porriges. Pastilli ex agno casto. Seminis agni casti, fructus amaricis vtriusque drachmae decem, seminis intybi drach. quinque, seminis portulacae tantundem, his aceto acris detritis, informato pastillos, & eorum vnum drachmarum trium pondere, aut alias pro morbi magnitudine, syrupo acido ex saccharo preparato, subactum, porrigito. Si vero agrotantis venae vniuersi corporis sanguine distenta turgent, venam axillarem sinistram, aut eam, quae ab hac ad sinistram manum, inter paruum ac anulare digi-

digitos repit, secabis, & sanguinem quantum
 pro laborantis corporis habitu satis esse con-
 deceris, fluere sines. Lienī quoque frustum hu-
 ius generis panni, quem vulgo filtrum voc-
 tant, aceto imbutum apponatur, & a dulcissi-
 morumque esu ager absteineat. Porro si A fri. mor.
 absque ardore quopiam lienis dolor, egrotan-
 tem torquet, pastilli de capparibus appella-
 ti, summe auxiliantur. Recipiunt autem, corti-
 cis radicū capparis, seminis agni casti vtrius-
 que drachmas decem, scolopendrii drachmas
 septem, aristolochiae tenuis, foliorum rutae,
 seminis nasturtii, acori, nigellae singulorum
 drachmas tres, ammoniaci drachmas tres,
 ammoniacum aceto diluit, & ceteris omni-
 bus eo aspersis, finguntur pastilli drachma-
 rum duarum pondere, quorum vnus syrue-
 po acido melle composito, et radicum iure ma-
 ceratus, potui datur. Porro si intensus tu- Ex fluxu
 midusque splen fuerit, & cum premitur rugi-
 tus aliquis sub tangentis manu auditur, iam
 comprehensos pastillos, radicum decocto di-
 lutos, praebeo. Potui autem vnum vetus, ac
 ceraculū porrigito, et quoad fieri potest, fr-
 gida

PARA. IN NONVM.

gide vsum subducito. Emplastrum ad il-
enis flatus, eiusdemq; simę partis duriciem
optime faciens. Foliorum rute drachmę de-
cem, nıtri, mentastri aridi vtriusq; drachmę
tres, ammoniaci drachmę septem. ammoni-
acum vino veteri subigito, & eo cetera per-
fusa, in emplastrum digerito, henisq; regioni
fascia, aut insıta illigato.

¶ De morbis intestini plenioris & tenuioris
hic tractat, ille κωλινος Gręcis dicitur.
Capit. lxxi.

Heus a fri-
gi, humo-
ro

SI ventris dolor, vna cū eiusdem astrictio-
ne, & ciborum fastidio offendit, absq; ri-
men omni ardore, & febris, eę quę alutum cū
tra vomitus irritationem ducunt, porrigen-
da sunt, cuius herę electuatiū ex gallia mor-
schata est. Quod accipit, mastiches, caryophy-
lorum, zingiberis, piperis nigri, piperis lon-
gi, cinnamomi, nucis myrsitica, & gallię mor-
schatę singulorum drachmas decem, scāmo-
nii drachmas decem, deinde exprimitur co-
ctoneorum acidorum & recentiu succus, qui
aqua mellis portione, donec medicinarum
ponderi ambo respondent, commiscetur, &

¶ Pastilli
sūt, & ad
seruntur
rx oriēte
nō bñ pa-
rati, Ma-
ar.

deinceps simul omnia, pedetenti supra prunas, ad debitā crassitiē decoquūt. Quātitas aut praesentis antidoti una vice exhibēda ē, inter drachmas duas, & duas cum semisse. Quod si dolor vehementi ciborū nausea vacet, & aeger deuorata medicamina vomita haudquaquē diuertit, catapotia ilco morbo sacra exhibētur. Quae cōfiāt, cucurbitae syluestris, sagapeni, vtriusq; drachmis decē, scammonij drachmis trib⁹ & scrupulo, singul⁹ catapotia, ex quibus eboli quinque administrant, hec etenim tenuioris intestini morbu depellunt. Ceterum si ileus in tantum seuiat, vt aluum ducentia pharmaca inualida sint, egrotanti hanc infra scriptam glandem subdes. Salis fossilis drachmę decem, medullae cucurbitę syluestris drachmę duę cum semisse, scammonij tantundem, his melle leuigatis, informato glandes ad longitudinem longanonis, ac ita subiūcito. At si nihil auxiliū prestitierint, clysterē hunc lenē (vt sua mœra feces emolliat) infundito, qui accipit, ficus caricae quinque, fursuris manipulum, altheae

tantum

PARA. IN NONVM

eantūdem, betæ folia decem, hæc linteo illi
 gato, ac in libris duabus aquæ ad dimidias
 decoquito, deinceps per linteum colato, &
 sesquidrachmam nitrī, & olei sesamini vnc
 am vnā illi adijcito, sicq; apparatus enema
 inijcito. Verum si hoc infusum acrius reddi
 desideres, iam comprehensę glandis drach
 mam & semissem ei contemperatō. Cly
 ster strenue fæces subducens, & superfluos
 succos abstergens, quo aluo medicamentis
 non cedente, neq; alias illis adiuuantibus
 vtimur. Carnis cucurbitæ syluestris drachi
 mę decem, centauri drachmæ quinę, vtriuf
 q; cyclaminis speciei drachmæ duę, menta
 stri, rutæ, origani cuiusq; manipultis vnus;
 omnia in aquę libris tribus ad duas tertias
 decoquuntur, & percolato decocto, cōmiscē
 tur. Resinæ cedrinæ, mellis singulorū drach
 mæ tres, castorei, sagapeni, opopanax, præ
 scriptę glandis cuiusq; drachmę duę, omni
 bus pistillo contusis & iam tepidis, clyster
 inijcitur. Ceterum si aluus induratum, ac
 quasi in nucleos diuisum stercus (quod Gre
 ci σκύνδαλον appellāt) minime egerit, in clyste
 ris

Sic Leo
 cicer^o al.
 chitrā vo

RHAEZAE DE MOR. CVR. 73.

ris vsu, donec illud expellatur, persistendum
 est. Siquidem comprehensum enema, in ilei
 intestini vicijis atrocibus ac vastis, & seuo
 colico affectu, qui cum magno ciborum pro-
 strato appetitu, nullaq; per aluū deiectione,
 affligit, vtiliter subiicitur. Presentem quoq;
 tenuioris intestini affectum, præter tradita
 Symptomata, foetidi ructus, & faecum non-
 nunq; per os eiectionis, concomitari consueve-
 runt, quæ quum hominem affligunt, mortē
 subinde minitantur. Porro si ventris do-
 lor, tam ingenti alui constrictione vacat, sed
 si flatibus distensus venter, murmure multo
 ægrum molestia afficiat, electuarium ex bac-
 cis lauri porrigitur. Hoc recipit, Foliorum
 rutæ aridorum drachmas decem, ammeos,
 cumini, ligustici, origani, nigellæ, cari Ale-
 xadrini, pulueris mentastri, dauci, aconiti, bac-
 carum lauri, castorei cuiusq; drachmas du-
 as, sagapeni drachmas quatuor, opopanax
 drachmas tres, excipiuntur omnia mellis æ-
 qua portione, & eius electuarij nucis auellæ-
 nę, aut alterius parue nucis Indicæ instar,
 indies datur, cum vini veteris & feruefacti

Colicæ ex
 flatu.
 N.B.

K vncia

ARAT. IN NON V. M.

Electuar
ria uocata
sub anti
doti noie
cōprehen
dere licet.

vincia, aut radicum incidētium decoctorū su
ris vncia. Hoc Electuario ad digerēdos fla
tuosos spiritus, nihil est efficacius. Præterea
glandem hanc spiritibus depellendis ac dis
cutiendis idoneam, aluo indito. Cumini, fo
liorum rutæ viridis vtriusq; tantum quan
tum manus apprehendit, vtriusq; cyclami
nis speciei drachmæ tres; nitri drachma ve
na, deterito hæc melle & lanam spongiam ue
illis circumlitam, in anum dimittito. Abdo
men quoq; penicillo, calidicre flatuq; diffi
pante liquore, inbuto, subinde foueto, ac irro
rato. Quinetiam agrum in labrum huiusce
modi flatus discutiendi vim obtinens, dedu
cito. Si vero his malum non cesserit, cucurbi
tulas magnas cum flamma & leues toti ab
domini defigere, locuraq; radiori ac aspero
linteo, perfricari præstat. Deinde crebræ in
unctiones, ex rutaceo oleo, aut aliō huic in ca
lesfaciendo finitimo, non alienæ sunt. Iā quo
q; castorei & euphorbiæ vtriusq; sedrachmā,
liquore quopiam lanigata, clysteris forma vi
tiliter infunditur. Qui autem hoc malum
teneri consuevit, dum sanus est, a vini diluto

& frigide aque potu, & herbarum, & lactis,
 & aliorum flatuosos spiritus gignentium a
 limentorum esu, se arceat. At vini meri potu
 utatur. Philonium, quod ileosis ad discu
 tiendos flatus, & soporem sensitiuaq; facula
 tatis stuporem inducendum, propinatur, cū
 scilicet summis tenentur cruciatibus, animi
 q; deficientis suspicio ingruit. Piperis, am
 meos, foliorum rute, mentastri, castorei, bacca
 rum lauri, cumini cuiusq; vncla vna, opij, mā
 dragore, seminis alterci singulorum semun
 cia, subiguntur simul cum mellis pari mo
 do, porrigitur vero eius medicamenti ses
 quidrachma. Plerumq; etiam huic phar
 maco commiscetur, scāmonij tertia pars vna
 cie vnus, vnde & alium quoq; citat. F. Phi
 lonis vero Tharsei anodynon habet, croci
 drachmas quinque, pyrethri vnā, euphorbij
 vnā, spice nardi vnā, piperis albi, alter
 ci vtriusq; drachmas viginti, opij drachmas
 decem, excipe melle, & ad eos qui stercora
 in maximis doloribus per vomitum reijci
 unt, dato magnitudine fabæ, ex ternis aupa
 ternis cyathis aquæ frigidae. I.

Ex 9. secū
 dū lotos
 Gale. & p.
 sermōe A
 etij, restitū
 ra desc
 ptio.

P A R A. I N N O N V M

Ceterum si dolori febris adsit, cassia fistula succo intybi decocto ac despumato, diluta, aegro offeritur, potui quoque syrupus violaceus dandus est. At cibis quibus herbae emollientes adiectae sunt, oleoque amygdalarum dulcium praeparatis, enutrietur. Item leuiore infusiones, ut ex oleo in quo foenogracum, aut althaea ebullierint, & anserino adipe, ab inferioribus partibus egrotanti injiciuntur.

Ex sanguine,

Porro si locus abdominis, qui a sinistro rene ad dextrum, per ventriculi fundum cincturae modo pertinet, tumidus conspicitur, & laxum intestinum quoque inflammatione correptum apparet, sine mora aperta dextri cubiti vena, sanguis minuendus est, & cassia fistula herbarum refrigerantium succo subacta, subinde propinanda. Item si tenue intestinum inflammatione infestetur, eadem praesidia praestanda sunt. Cibus vero aegro huiusmodi colli vitio per circuitus quosdam torqueri solito, conveniet, qui herbis aluum emollientibus praeparatus, oleum quoque sesaminum in condimentum accipit. Ab omni porro acidorum, austerorum, crassorum, aliumque astrin-

astringentium esu, in totum abstinendū ē.

Eum vero quem cum dolore, flatus quoque implicare solent, pulmētis aromaticis speciebus, aut calidioribus incidentibusque seminibus conditis, nutrire conuenit. Proinde e contrario, ab olerum, lactis, & flatus excitantium ciborum ingestione, abstinere ex usu est. Potui vero vinum vehemens incorruptumque propinabitur, aut hydromel, cui medicamina incidentia excalescentiaque in condimentum iniecta sunt, ex quorum numero piper est, porrigetur. Huiusmodi autem hydromel, quod subiicitur est. Commisceto mellis puri libram, aque potabilis libris sex, & tantisper dum zulapou crassitiem ambo recipiant, decoquito, spumamque detrahito, & diligenter peracto, ad singulas libras hydromelitis, piperis contriti drachmas duas linteolo illigatas, quousque hydromel adamsim decoctum sit, immittito, & ubi refrigerit, diligenter expressum linteolum eximito, poscente quidem usu, eius portione propinato. Eos quoque quibus ex flatibus & crassis crudisque humoribus dolor esse consuevit,

Vict? ratio in doloribus ex flatibus,

strenue

PARA. IN NONVM

strenue iuuat, ricini fructicis oleum, recens
 et seminum decocto contemperatum. Præ-
 sens quidem seminum ius accipit. Amma-
 os, cumini, ligustici, cnici, origani, nigellæ
 cuiusq; quantum trinis digitis comprehen-
 ditur, hæc aquæ libris tribus immissa, ad di-
 midias decoquuntur, vñs autem eius est, si
 ipsius vñs duabus, olei ricini drachmas
 tres dilueris, pluribusq; diebus ea quantita-
 te, potui porrexeris. Verum si dolorem
 ardor concomitetur, sumito pruna viginti,
 ficus caricas quinque, vuarum passarum ab-
 acinis mundatarum drachmas quinque, deco-
 quito & percolato, ac posteaquam cassiam fi-
 stulam in eo decocto subegeris, secundo per-
 colum trañcito, & amygdalarum oleo adie-
 cto, potandum porrigito. Vel decoctum in
 capite de distillatione commemoratum, ei-
 loco offerito. Cæterum si alius vehementer
 stricta fuerit, huic iuri adiciuntur siliculæ,
 turbit vtriusq; drachmæ duæ, & his simul
 decoctis, tantisper dum alius responder, ve-
 temur. Posteaq; vero cita ea profluxerit, po-
 lypodium, & turbit amoueunt. Puluis
 qui

qui aluum ducendo simul flatūs, & grauitates reprimat. Turbit albi et amygdalarū dulcium oleo irrorati, ac in puluerē adamussim cōtriti drach. viginti, sacchari drach. triginta, zingiberis drachmē decē, hui⁹ qdē pulueris vt plurimū drachmæ 3 tres offeruntur.

☞ Sufficer
duz.

Catapotia quorū vnum deuoratu, ventrem deijcit, & appetitum incitat, & flatuosos spiritus grauitatesq; reprimat, ad hac ciborum concoctionem iuuat. Mastiches, zingiberis, cinnamomi, caryophylorum, pæoniae, piperis nigri, piperis longi, scammoni, sacchari, violarum cuiusque vncia vna, finguntur catapotia cicerum instar, & eorum vnum transglutitum aluum semel bisue deijcit.

¶ De ventris profluvio. Ca. lxxii. A calido humore.

Quando assumptus cibus solita mora in ventriculo non retentus, citius paululum immutatus egeritur, & si huic vitio intestinorum, & ani musculorum ob excrementorum acrimoniam erosio, & ventris cruciatus affuerint, præterea quoque, si huius alui pfluuū excrementa ante ciborū ingestio

PARA. IN NONVM

¶ Nos a
celosq vo
cata her
ba vte
mur.

ingestionem excreta, sanie quampiam admix-
ta habeant, egrotanti ex immaturis vuis de
coctione inspissatus succus, aut 3^{re} rebes, aut ma-
lorum punicorum cum spodio & rosarum vtriusque
drachma vna propinabitur. Pastilli quoque
ex spodio astringentes identidem utiliter of-
feruntur. Cibi porro sunt lenticula cum a-
qua, aceto & croci momento decocta, & pul-
li cum aceto elixi, idemque assi, & omphacino
incti. Potui vero rhus obsoniorum rosacea
aqua dilutum, aut malorum punicorum
succus exhibebitur. Præterea cibi rhus ob-
soniorum in condimentum accipientibus ci-
babit, & breuiter tota victus rationem ad refri-
ctionem & astrictionem dirigere consilium est.
Ceterum si absque huiusmodi erosione alius
lubrica molesta sit, si quoque quod fluxu ege-
ritur nullam saniem admixtam habeat, sed
viscosum, & albidum glutinosumque id cerni-
tur, præter hæc etiam, si inflammatio modi-
ca, siuis exigua & ructus acidi affuerint, la-
boranti betam, & sinapi, & salices pisces
aliaue incidendi vim possidentia, admini-
strabis, & deinde anethum simul cum salis

mo

momento, in aqua decoques, & posteaquam percolaueris, adijcies percolato iuri, mellis quod satis est, & sic post incidentia pituitam ingesta propinabis, eoque pacto digito, aut pinna ori indita, vomitum prouocabis. At si affectus, ob humorum copiam ventriculi tunicis imbutam, illo curationis modo non conquieuerit, pituitam ducens, pharmacum præbebis. Cuius generis quod iam subsequitur censetur. Aloës drachma vna, cucurbitæ syluestris carnis drachmæ quatuor, sacchari tantundem, turbit drachma vna, ex his formantur catapotia, quæ uni propinationi sufficiunt. Ad hæc vomitu ex incidentibus sæpius uti expedit. Cibos autem, quibus æger vescitur, in muriam intingere iuuat, ut inde incidendi & calefaciendi vim obtineant. Proinde quoque cibis sale conditis, ac acri gustu præditis, breuiter suo calore appetitum incitantibus edulijis, opportune ægrum cibabis. Si id quod per aluum deijcitur, nihil superflui biliosi nihil saniosum, nihilque pituitosum admixtum habeat, vinum merum robustumque offe-

✥ Potius tribus, & i robusto corpore.

Ex naturalium facultatibus in becillitate a frigore et humore.

P A R A . I N N O N N V M

offeretur. Similiter electuariū quoque ex thure
reprebatur, quod accipit, thuris drachmas
decem, piperis, ammeos, spice, ligustici, a-
nisi, nigellæ cuscusq; drachmas duas, balau-
stiorum drachmas decem, mellis dispensati
quantum ad predictas medicinas excipien-
das sat est. Huius vero antidoti vsus pro-
batur, quoniam ventriculum impense cale-
faciat, mirificeq; exciccet. Seminum quo-
que decoctum, ad plenioris intestini morbum
idoneum, propinabitur, vniq; meri potu
eger assuescit. Ceterum si assumptus ci-
bus crudus haudquaquam egeritur, sed ad-
sa quedam, & alba tenuisq; substantia ex-
cernitur, vna cum iocinoris imbecillitatis
notis, egro ex ferri stercore electuariū, &
id quod ex thure sit, porrigentur. Et pastil-
li quoque quos calefaciēdo iocinori inscripsi,
& electuariū diacalaminthes, vtiliter ad-
ministrabuntur. Diacalaminthes autem cō-
positio est huiusmodi. Foliorum rutæ, foli-
orum calaminthæ exciccatorum, ammeos, ca-
ri, ligustici, zingiberis, cinnamomi, longi pi-
peris singulorum eque portiones, omnia de-

Ob ieco-

ris obstru-

ctionē &

attracim

becillita-

tem.

Ob ieco-

ris obstru-

ctionē &

attracim

becillita-

tem.

Ob ieco-

ris obstru-

ctionē &

attracim

becillita-

tem.

Ob ieco-

ris obstru-

ctionē &

attracim

becillita-

tem.

Ob ieco-

ris obstru-

ctionē &

attracim

becillita-

Differt a
Galen. 4.
de sanita-
teturanda.

cocto melle excipiuntur. Item præter hæc
ad ea quæ calefaciendo corroborandocq; io-
cinori comprehensa sunt, recurrendum.

Ex uentri-
culi et gra-
ciliū inte-
stinorum
vitio.

Porro si commoratus affectus, iocinoris
imbecilli indicijs caruerit, sique quod flu-
xu egeritur, tenue subalbidumq; vna cum
ventriculi grauitate extiterit, malorum pu-
nicorum puluis deuorandus dabitur. Pre-
paratur autem, ex acinorum mali punicia
cidi, assorum & in tenuissimum puluerem
factorum drachmis centum, cnici, seminis
coriandri vtriusq; in aceto acerrimo mace-
ratorum, ac deinceps torrefactorum drach-
mis viginti, & xylocaractæ, rhois Syrena-
ici, balaustiorum cuiusq; drachmis decem,
omnia in tenuissimum puluerem teruntur,
qui deinceps transglutiendus offertur. E-
lectuarium quoq; Cazi inscriptum, oppor-
tune offertur. Cuius mixtura in hunc modū
se habet. Acinorū vñe passę i tenuissimū pul-
uerē tritorū libra vna, baccarū mirti arida-
rū, ac pari ratiōe subactarū librę quicq; xylo-
cratę Nabathææ, balaustij seminis tamaris-
sis, ammeos singulorū drachmæ decē, confi-
plasma

& Opior
quorundā
ignorum
astringen-
tium pu-
tamina.

P A R A . I N N O N V M

ciuntur omnia saccharo arūdinibus innato, seu apum melle quam exactissime spuma liberato, & deinceps huius portio pro morbi magnitudine præbetur. At si defluuū al

Ob bilis
copiā in
vêtriculū
& intesti
na regur
gitatem.

ui recrementa flaua, & anum mordicantia inueniantur, & eger siti febricq; corripitur, pastilli astringētes ex spodio, & aqua crudæ pollentē hordei, prospere porrigentur. Pastil

lorum autem astringentium ex spodio mixtura, ad hunc modum se habet. Rosarum rubrarum, spodij singulorum drachmę decem, seminis rumicis, rhois Syrenaici, balauſtj, gūmi Arabici cuiusq; drachmę quinq; rediguntur in pastillos drachmarum duarum pondere, quorum vnus vncia decocto cydoniorum succo, & sextante succi plantaginis dissolutus, potui datur. Aquam quidem pol

lentæ hordei, hac ratione preparabis. Hordeum confractum, in aqua quæ ipsum tegit, tantisper dum aqua modice inspissetur, decoquito, deinde percolato, & eius vncias quatuor cum spodij, & gūmi Arabici viriusq; drachmis tribus dilutas, porrigito. Quod si ventris fluxui intestinorum exulceratio serpen

do de

do depascens, superuenerit, lapidis Armenij
 puluerē deuorandū exhibeas. Qui cōstat, se-
 minis herbæ pulicaris drachmis vīginti, se-
 minis plantaginis drachmis decem, gūmi A-
 rabici, lapidis Armenij vtriusq; drachmis tri-
 bus, pulicaris herbæ semine torrefacto, om-
 nia simul cum illo in puluerem subiges, ac e-
 um in aurora drachmarum trium pondere,
 cum discocto cotoneorum succo, potui porri-
 ges, ac somnū inītūrō egro, tātūdē pbe offe-
 res. Inter cibos qdē administrabis pulmen-
 tum, cui punicorum malorum acini, & vuæ
 passæ, & posca adiecta sūt, præterea eū, qui
 ex omphacino conficitur, & qui rhus Syre-
 naicum in condimentum accipit. Similiter
 quoque ex herbis alium emollientibus, cū
 ihoi præparatum edulium, & id genus alia,
 edenda appones. Ad hæc pastillos de balau-
 stijs continuæ leuitati intestinorum (quæ
 Græcis λευπεξια dicitur) dicatos, si modo
 alius continenter fluat, propinabis, nec re-
 fert, an eius ventris profluuij recremēta san-
 guine tincta, intinctaue sunt. Recipiūt ita-
 que pastilli commemorati. Gallarum, sili-
 qua

Potui lae-
 scissū por-
 rectū ab
 Alex. pro-
 batur.

Itquarum Nabathææ, seminis camariscis,
thuris, balausti singulorum aquas partes
opij, gummi Arabici vtriusque partem dia-
midiam, his cydoniorum malorum succo ac-
persis, informato pastillos duarum dracho-
marum pondere, atq; vnum si neq; siti, ne-
q; febris crucietur æger, vino læuigatum,
præbeto. Præsenti autem febris, decoctione
inspissato cotoneorum succo detritos, propti-
nato. Sane hi pastilli in magnis & continen-
tibus alui fluxibus, vt efficacissimi com-
mendantur.

Tenesm. Pastilli tenesmo sacri, qui
malignis flatibus, & murmure infestantibus
absente tamen calore, porrigendi sunt. Semi-
nis hyoscyami albi, seminis anetini, seminis
foeniculi, singulorum drachmæ quinque, am-
meos drachmæ duæ cum semisse, opij drach-
mæ tres, seminis apij drachmæ decem. hæc
vino subacta in pastillos redigito, ac vnum
sesquidrachmæ pondere vino læuigatum,
potui offerito. Compositio electuarij de
styrace, vetusto ventris fluxui, & tenesmo
cum flatibus malignis, absque febris, & ar-
dore infestante utilissima, Castorei, opij, asari,
styracis

RHAE DE MOR. CVR. .80.

Syracis liquide, myrrhe, seminis alterci nigris, thuris cuiusque eque portiones, mellis quantum ad simplicium medicinarum exceptionem sat est, huius quidem pondus inter duas drachmas & tres, ut plurimum proportionabitur. Si tenesmus post decimum diem protrahatur fuerit, nec medicamina quicquam praestitum attulisse cernantur, & egrum circa peccatum dolor aliquis exercet, ad subscriptum clysterem recurrendum est.

Panacis, oryze, lentium, quibus tribus cortices detracti sint, rosarum siccarum, balaustrorum, calicium glandium cuiusque manipulus unus, omnia tribus libris aque potabilis ad dimidias incoquantur, & deinceps percolantur, insuper sumuntur cerusse, cineris charte Babylonice, aut si eius facultas non est, cineris alterius charte utriusque drachma una, lapidis Armenii sedrachma, vitellus cui assus induratusque, olei rosacei semuncia. haec omnia iam narrato decocto subacta, commixtaque, semel bisue clysteris forma, egrorum tantum infunduntur. Porro si tenesmus in vetustate incidit, ac nullus sanguis, sed rasura alba & mucosa, seminum cremori non absimilis,

perfluxe

A putri
pituita,

PARA. IN NONVM

profluxerit, pharmaco putredinibus sacro,
capite quo gingivarum putrescentium cura-
rationem persecuti sumus descripto, rectissi-
sime ad hunc modum vteris. Portionem ali-
quam eius medicamenti in paulo ante de-
scripto decocto subigito, & clysterem vnum
atq; alterum in aluum ex eo dimittito. Qd
si alui profluuium vehemens erosio ventris co-
mes sit, enema ex oleo rosaceo egelido, tan-
risper dum curetur, subinde injiciendum ē.

Ad fri. af-
fectum v-
tile est.

Epithema quo venter vehementi & con-
tinuo profluuium afflicto, ac virium robore
languidus, illinendus est. Galliæ moschatæ,
acaciæ, cyperi, myrrhæ, gallarum, cupressi,
thuris omnium partes æquales, his vino ve-
teri & subastringente, aut cotoneorum suc-
co aspersis, venter crebro irrorandus est.
Huic quoq; nonnunq; panis bis coctus ex
Syria commiscetur. Cæterum si morbum ar-
dor concomitetur, epithema quod duobus sa-
dalis, rosis a fibris liberis, lapide Armenio,
nuce Indica, galla, pane bis cocto & succo
malorum puniceorum acidorum, aut cotoneorum,
aut succo myrtino, constat, presidio erit. Si

RHAZAE DE MOR. CVR. .si.

autem vehementi tenesmo æger tenerur, sæpeq; ad secessum properat, tamen nihil nisi forte muccosum quid egerit, glās ista subiicienda est, siquidem mirifice tenesimum sensoria facultatis torporem inducens, sedit.

Thuris, lycij, croci, gummi Arabici cuiusq; drachma vna, opij drachmę duæ, informantur & glandes, quæ ano induntur.

¶ De urinae difficultate. Cap. lxxiii.

Quod si vrina modica excernit, aut in totū supprimitur, nullo tamen in inguinibus appaete tumore, & nullo praesente dolore, qui aut renes, aut vrinae meatus, infestet, infra scriptis medicaminibus vrinae ciendae vim possidentibus, subueniendum est. Cuius notæ, hoc quod modo subiicitur est. Seminis apij, nitri naturalis, rubi æ satiuę, apij Macedonici, baccarum iuniperi, seminis asari, ammeos, seminis foeniculi, spicae, amygdalarum amararum cuiusque drachmę viginti, seminis melonum drachmę decem, cantaridum quarum & alæ & pita abiecta sunt drachma vna, ammoniaci drachmæ tres. Ammoniacum vino di-

† Alex. ad
nuclei p
nei mag
nitudinē
pauloue
maiores
eas fieri
precipit.
A partiū
debilitatē

† Ezech.
alas sine
das autē
mat.

Ab exter-
na causa.

lulur, ac eo reliquis exceptis, formantur for-
mula auellanae nucis instar, quarum portio
inter drachmam vnam & tres vna propinati-
one ex ciceru decocto offertur. Sane hoc me-
dicamen habitus molliciei, eiusdem laxitati,
hyposarce, efficiendisq; his quorum occasione
corpus exiccari consuevit, accommodum cen-
setur. Si vrinae difficultas a casu, aut for-
morum, aut ani circumiacentiumue partium
plaga, apprehendit, agrotanti sanguis axil-
lari vena periusa (partita interim sanguinis
missione) detrahetur, & locus affectus ege-
lida aqua, & calidioribus oleis ad medij di-
ei spatium irrorabitur. Aeger quoq; ad v-
rinae excretionem ehortandus est, quam o-
ptime spiritus retentioe, & musculorum o-
cto abdominis compressione, perficiet.
At si suppressio vrinae vesica plena ac inten-
sa, molester, praesertim post sanguinis, aut
puris eruptionem, medicamina, quae gru-
mos sanguinis, & pus discutere colliquare
que solent, propinanda sunt. Medicamen-
grumis sanguinis, & pure vesicae amouen-
dis vehementer generosum. Cardamomi,
myr-

myrrhæ, rubiæ sativæ, qua vestes inficiuntur, baccarum iuniperi, ammoniaci, liquoris Cyrenaici singulorum æque portiones ammoniacum fœniculi succo, aut simili aliquo læuigatur, & eo alia excepta in catapotia digeruntur, ex quibus drachma vna quater in die, cum comprehensi seminum decocti vncijs tribus, propinatur. Syrupus quoque acidus aceto acerrimo præparatus, subinde porrigendus est. Ad hæc per syphonem aqua sale diluta, aut lixiuium opportune inijcitur. Compositio autem lixiuij ad id efficacis, ad hunc modum præparatur. Cineris † ilicis, cineris sarmentorum, fœcis vini vstæ, calcis cuiusq; debitæ portiones, his aqua quousq; tegantur, super additur, sicq; triduo seponuntur, deinde illis per colum transmissis, lixiuium reconditur, & eius modica portio per syphonem in vesicam demittitur, Cnici etiam folia, et blitum cum modico olei amygdalarum decocta affecto loco superaccommodantur. In solo præterea incessus, cui chamæmelum, stichas Arabica, sampsuchus & sisymbrium

L ii inco-

† alias
glandiæ

PARA. IN NONVM

decocta sint, ægro strenue auxiliantur. Poterit quoque huiusmodi solium ex brassicarum summitatibus, & blito, & stercore columbino in aqua decoctis, adaptari. Sane in his decoctis quoad per vires licebit, magno presidio æger desidebit, atque ex iam comprehensis herbis, cataplasmata ac fots inguinibus & circumiacentibus partibus, utiliter inducet. Quando autem folio insedit, ea quæ urinas citant ac mouent, potui dare confert. Verum si hæc vniuersa inefficacia sunt, ad instrumentum urinis eliciendis aptum (syphonem, aut catheteram vocant) recurrendum est. Si vero urinae difficultas post calculi indicia oboriatur, agrum supine procumbentem, pedes ac genua varijs motionibus in altum cōquassare concutereque decet. Cæterum si urina non profluxerit, operæ precium erit, & hic quoque, ad depellendum calculum colli vesicæ orificio incumbentem, instrumento (quo in vesicam demisso urina emollitur) auxilium præstare. Percauendum tamen, ne vesicæ ceruix inflammatione tentata, eius instrumenti dimissione iritetur, Ad suppressam urinam inter

inter cetera mirifice conducunt, frequentes
in labro calidiorē infessus, & ex oleis calia-
dioribus emollientibusq; crebra inunctio-
nes. Item medicamenta vrinas mouentia e-
pota praesidiū praestant. Maxima igitur di-
ligentia ab acidorum, austerorum, crassorum
q; esu, egrotantem circumcidere, conducit.

¶ De renum & vesicae calculo. Ca. lxxiiii.

Lapidem vesicae declarant, continue g-
gri pudendorum infractiones, & ipso-
rum frequens tentigo, subitusq; ipsis obor-
tus languor, praeterea cum crebra mingen-
di difficultate, vrinarum propulsio, in quo
affectu longanum quoque a vesicae calculo
compressum, interdum procidere solet.

A crasso
terreoq;
humore
ignea cali-
ditate in-
crassato

At calculum renibus innatum, testantur la-
borantis cum vrinarum in principio sup-
pressionē, vehemens renum & meatuum, p-
quos vrina e renibus in vesicam distillat, &
circumiacentium partium, & inguinum do-
lor, & aluus initio astricta, & ciborum nau-
sea.

Calculo quidem in vesica increto,
haec infra scripta compositio utilis est, quo-
niam ad comminuendum lapidem etiam
vetusti

PARA. IN NONVM

23. vetustiore, mirifice efficax est. Et ego
 23. quocq; eius usu, magnum lapidem minori
 23. quadraginta dierum spacio, contregi. Ha-
 23. bet autem ea se in hunc modum. Fructus
 23. balsami, seminis raphani, dauci, seminis
 23. apij Macedonici, corticum radicum opopa-
 23. naciis, corticum radicum capparis, amyg-
 23. dalarum amararum, baccarum lauri, funici
 23. rotundi, cyperi, spicæ Indicæ, casia lignæ,
 23. æ, scolopendrij, seminis rutæ sylvestris,
 23. gentianæ, aristolochiæ rotundæ, asari, cari-
 23. damomi, ammoniaci, sagapeni, bdellij, pi-
 23. peris, acori omnium æquæ portiones, gum-
 23. mi in balsami liquore diluti quantum ad ex-
 23. cipiendas medicinas sat est, ex his singun-
 23. tur globuli, & singulis dieb⁹ eorum drach-
 23. ma seminum incidentium decocto soluta,
 propinatur. Nonnunquam & obulus ci-
 nerum scorpionum vna cum eis porrigitur.
 Scorpionum porro cineres, in hunc modum
 apparari solent. Accipiuntur scorpiones,
 qui in ollam stictilem repositi, & olla dili-
 gentissime obturata, super regulam in fur-
 num non vsque adeo calidum dimittuntur.

Ole. liquis-
 tici sup;
 103:6.

Scorpio
 num sine
 104.

etur, ibique ad sex horarum spacium sinuntur, & insuper exempti, ac in tenuissimum cinerem triti, vsui futuro reponuntur. Ac aeger decocto cicerum, & cibis aromatibus seminibusque calidioribus preparatis, alendus est, a lactis vero, & casei aliorumque crassorum, & glutinosorum ciborum esu, reuocandus, quoniam eorum succus facile in calculum a caliditate induratur. Præterea consuetudet aeger solium, cui brassicarum folia, sampsuchus, & blitum, abrotanum, mentastrum, columbinum stercus, & medulla seminis cnicī incocta sunt. Quinetiam inguina scorpionum oleo inungenda sunt, atque eius momentum in vesicam per siphonem infundendum. Oleum scorpionum. Aristolochiæ rotundæ, gentianæ, cyperi, corticis radicis capparis cuiusque vncia vna, hæc in libra olei amygdalarum amararū soli exposita, marcescere septimana vna sinunt, deinde expressa percolant, in cuius percolati libra injiciunt scorpiones lecti, & iam oīa rursus in vasculū adamum, sicut occlusum, ad solem duabus hebdomadis

Viribus
nre spina
chie respō
det.

don
omif

PARA. IN NONVM

Apud
Pau. li 6.
ca. 60. &
Cel. li. 7.
ca. 26.

reponuntur, dein per colum trañciuntur, & futuro vsui reconditur oleum. Quum itaq; hoc genus olei q̃ optimum ac laudatissimū ad propositum affectum existimatur, eius portio per guttulas in ægri penem postquā e folio descenderit, rectissime inditur. Ceterum si lapis in vesica impendio increuerit, il-
li nullum, nisi a manuali incisione, qua euel-
li queat, remedium præstari potest. Verū
huius sectionem perscribere, nostri propo-
si-
ti libri limites haudquaquam admittunt.

Cum autem renibus calculus innatus ē, æger in solium emolliendi vi præditum, fre-
quenter se demittet, & renes, & lumbos,
nup enarratis oleis inūget. Ac lītea q̃q; ca-
lesfaciēdi vi obtinentibus liq̃rib⁹, immersa,
dolenti loco admouebit, ex quorum classe ea,
quę hactenus enumerauimus medicamina
sunt. Potui autem calculos confringentia dis-
secantiaq; nō tamē manifesto calefacientia,
præbeto Verum si euenerit calculum
ex renibus per meatus vrinarios, quos Græ-
ci οὐρητιχες vocant, in vesicam decumbere, ea-
q; occasione vesicę ceruicem obturare, aut si
idem

idem a vesicæ calculo fiat, aqua calida paulatim ab alto pudendorum partibus donec rubore suffunduntur instillanda est. Porro extrema urgente necessitate, ad exteriora succio remedio erit, siquidem ea calculum dimovebit, & cum vrina fortasse extra penem simul alliciet. Quoniam si angulosus magnusue extiterit, inferiorem vesicæ cervicis partem, qua scilicet eius corpus spectat, incidere necessitas iubet, ut hinc lapis manuali arte euelli queat.

¶ De renum & vesicæ inflammatione. Ca. lxxv.

Phlegmonem renum, concomitatur febris inordinata, nec usque adeo ardens, sed quæ cum horrore, & rigore apprehendit, & frequens mictus, & partium dorsalium dolor grauis, unde si quando æger dimouetur, in his partibus pondus tãquam ab illis suspensum, propendere sentit. Cum itaque hæ notæ conspiciuntur, si modo nihil aliud prohibet, citra cunctationem in principio, axillari vena edirecto partis dolentis grauitateque implicitæ secta, sanguinem ægro minus. Regiõ quocumque dolenti forinsecus cataplasma

Renum;

PARA. IN NONVM

plasmata, & fetus, qui mediocrem refrigerandi vim obtinent, accommodabuntur, quorum usu propulso affectu, nulla suppuratio expectanda est. Ceterum si neque dolor, neque febris neque grauitas horum applicatione conquieuerint, vrineque stillicidium egrum laboriose molestauerit, pus hac in parte colligi recte putabitur. Tunc itaque cataplasma dorso induces, quod chamæmelo, semine lini & fursuribus, oleo sesami simul exceptis, constat. Iam etiam in solio ex emollientibus herbis parato, in sessus summe profunt. Porro si eger pus minxerit, semina subsequente capite de vrine ardore recensenda, donec imminuatur decessatque pus, agrotanti offeres. Deinde pastillos capite sanguinis & puris mictui dicato, inscribendos, exhibebis. Inflammationi autem vesicæ, comites sunt, febris & continua ardor, & vrine reddendæ impotentia, & ceruicis vesicæ, & fœmorū imique ventris dolor. Quirre venam hoc affectu implicito, incidere præsidio est, & alia quæ renum inflammationi accommoda retulimus, adhibere, consilium est. Ceterum non omnis renum infla-

Vesicæ.
& Interpres, conclusa.

Scirrhi renum curatio.

matio

matio in vomicam transit; seu discutitur, sed
aliqua in duritiem etiam occallescit, cuius
grauitas in renibus tanquam ab illis suspen-
sa, absente febris, molestiam infert. Huic
igitur clysteres infusi ex foenograci, & semi-
nis lini cremoribus, atq; ex chamæmeli, bras-
sicarum, meliloti, maluæ siluestris & fur-
furum decocto, vehementer conducunt.

Nec minus irritatus vomitus, ob materiæ
diuersionem, adiuvat. Cataplasmata quoq;
iam comprehensis emollientibus medicamē-
tis preparata, regioni renum accommoda-
ta, non parum auxiliantur. Iam si vris-
na modica egeritur, prædictis, ea quæ vri-
næ ciendæ sunt, accommode adiiciuntur.
Sane huic quidem affectui non mediocrem
curâ diligentiaq; adhibere cōuenit, quoniā
huiuscemodi renū durities (quā Græci *ὀνίξ*
ὄν appellant) aquę inter cutē interdū autor,
nō aliter q̃ iocinoris aut lienis, esse cōsuevit.

¶ De urinae ardore. Caput. lxxvi.

Q Vando ægro inter mingendum ar-
dor, punctilesq; cruciatus in vesicę
cervice oboriūtur, a falsis, acidis & acribus

*Sunt
renum
MS:*

MS.

*Ob vrinę
a calidis
succis ac-
rimoniam.*

cir-

PARA. IN NONNUM

circumscindendus est. Et cibis alium emol-
 lientibus herbis præparatis, & iusculis, his
 q̄ in leniendo v̄tre paribus, alendus. Quin-
 etiam ad reprimendum humorum acrimoni-
 am, subsequens medicamen porrigendū est.
 Seminis melonum excorticati drachmę tri-
 ginta, seminis cucumeris citrinati, seminis
 cucurbite domesticæ, seminis portulacę, se-
 minis papaveris albi, singulorum drachmæ
 tres, seminis alterci albi drachmæ duę, sac-
 chari albißimi quantum simul omnia pen-
 dent, huius pulveris quotidie drachmę tres
 mane & tantundem dormituro ægro cum
 vncia syrupi violacei, aut iozulapou offerun-
 tur. Ad hanc quoque noxam q̄ diligentissi-
 me attentum Medicum esse oportet, siquidē
 vrine acrimonia dum perseverat, vesicę &
 vrine meatuum, exulcerationē creare solet.

¶ Ad sanguinē & pus mingētes. Ca. lxxvii.

Ob ve-
 nez ruptu-
 ram.

SI a casu, aut plaga alicui sanguis per pe-
 nem erumpat, vena axillaris (partita in-
 terim sanguinis detractiōe) recte secatur,
 & pastilli ex succino potui porriguntur.
 Pastilli de succino. Succini, gummi Arabi-
 ci

ci vtriusque drachmę quinque, balauftiorum
 drachmę duę cum femisse, hypocistidos tan-
 turdem, thuris drachmę duę, seminis opij v-
 triusq; drachma vna, rediguntur in pastillos
 sesquidrachmę pondere, quorū vnus q̄tidie
 rhois decocto dilutus, vtiliter offertur. Inter
 cibos quidem, conueniunt glutinosę & vis-
 cosę carnes cum rhu obsoniorū, aut empha-
 cino elixę, a salsis autem & acribus opportu-
 ne eger arcetur. Verum ic̄to loco cataplasma
 ex lapide Armenio, acacia, aloë & lycio posca
 exceptis, superaccommodabitur. Si sangui-
 nis eruptione post acrium esum, aut vini a-
 crioris calidiorisq; vsum, eger angitur, vena
 axillaris ad sanguinis retractionem, inciden-
 da est, atq; pastilli ex succino exhibendi. Vni-
 uersa autem victus ratio, plane eadem cū prę-
 cedentium erit. Ceterum si ex vlcere ero-
 sione concitato, pus minxerit, pastillos hos
 prębeto. Constant autem, seminis melonum
 seminis cucumeris citrinati, cucurbite dome-
 sticę singulorum corticibus liberatorū drach-
 mis viginti, lapidis Armenij, gummi Arabi-
 ci, thuris pinguioris, cinnabaris singulorum
 drachmę

Ex vena
 rū erosio-
 ne.

PARA IN NONVM

drachmis decem, opij drachmis tribus, seminis apij drachmis duabus, finguntur pastilli drachmarum duarum pondere, quorum vnus vncia syrupi albi papaueris detritus, potui offertur. Quinetiam catuici vesicæ, infra scripti collyrii portio, per syphonem vtiliter inditur. Collyrium de cerussa.

Cerussæ, sarcocollæ, thuris, gummi Arabici, opij, cinnabaris singulorum æque portiones, hæc succo portulacæ aspersa, in collyria rediguntur. Deinde per syphonem mulsæ egro in vesicam infunditur, ac ad vrinæ excretionem incitatur, insuper postquam vrinam emiserit, huius collyrii portio alio lacte soluta, per syphonem vesicæ infunditur.

¶ De his qui inuiti urinam reddunt.

Caput. lxxviii.

SI æger magnam vrinæ portionem emingit, nullam tamen inter egerendum acrimoniam ardoremue percipiat, aut si quis noctu se commingit, verum neque siti, neque aliqua corporis macie, colliquationeue inde tenetur, ea quæ vrinæ restringenda sunt

sunt, vtiliter vtrisque offeruntur. Quale quod iam subsequitur medicamen est. Glandium drachma vna, thuris drachmę triginta, seminis coriandri exiccati, gummi Arabici, lapidis Armenij singulorum drachmę decē, omnia in puluerem subiguntur, cuius mane drachmę tres, & totidem sub noctem, cum momento decoctionis inule campanę, vt medicamen ad vesicam vsq; deueniat, propinantur. ¶ Quoniam vero hic affectus, renū retentricis imbecillitatem, aut vrinę meatum ambientem musculum relaxatum, aut aliam quampiam frigidam, vel humidam occasionem sui autorem habere solet, non immerito his dum puluerem offers, ipsis dicatis remedijs pspicere debes. ¶ Quod si *diabētis* eger in hoc affectu, siti inexplebili, quæ nimio cruciaru clamorē excitet, cōficiatur, & potio protinus qualis assumpta est, per vrinas trāsmittit, hordei decoctū cū herbę pulicaris seminis cremore, porrigendū ē, & æger immaturarum vuarum succo, & cibus illo, & rhoi Syrenaico præparatis, & alijs is persimilibus eduljjs, enutriendus est.

PARA. IN NONVM.

Aëtio lac
scissū ha-
bet.

Rob vo
cant,

Lac quoq; acidum ex quo butyrum coactū
sit, & quæ ex hordeo cortice libero paratur
puls, magno auxilio offeruntur. Potui autē,
decoctione ignis aut solis inspissati succi, q
acida qualitate pollent, propinabūtur, & ab
omni exercitio, & mulierū concubitu eger
arcebitur. Præclare vero faciunt hi pastil-
li potui oblatis. Spodii drachmę decem, semi-
nis lactuce, seminis portulacę vtriusq; drach-
mæ quindēcim, coriandri exiccati drachma
vna, rosarum rubrarū, lapidis Armenij sin-
gulorum drachmę quinq; , balauſtij drach-
mę duę , camphorę ſedrachma, teruntur in
puluerem, & plantaginis succo excepta, dige-
runtur in pastillos, & eorum drachma ma-
lorum punicorum acidorum succo subacta,
porrigitur. Herbae etiam infrigidantes, vt
portulaca, plantago, & solatrum, commode-
renum regioni superligantur. Ab omni q-
dem calidorum ciborum esu, & vino, ac his
quę vrinas citāt, imprimis abstinere cōfert.

Inter ea quæ stolidorum imperitorūq;
Medicorum inscitia, in hoc affectu delinq-
solent, totius corporis tabes colliquatione

primas obtinet, in quā aegrū ppinatiōe calidū medicaminū et vrinas promouētium, euestigio inducunt.

¶ De lūbricis in anō ac uētre natis. C. lxxix.

Qui hoc malo torqueri solet, a crassīs & glutinosīs ac pinguib⁹ cibis, ni-
miāq; alimentī infartiōe abstineat oportet,
& indies panis offulas sinapi muriāq; im-
mersas, ante cibos magna utilitate assumet,
siquidē ea ratiōe, lumbricos pcreati prohibe-
bit. quoniā origo oīm triū generū lūbrico-
rū, ex cruda, crassa pituitosaq; materia pu-
tredini accōmoda, existit. Si tamē nihilomi-
nus intestinis innascent, nullum ab expulsi-
one remedium est. Medicamen potro tere-
res, & longos rotundosq; lūbricos expellēs
præparatur, ex semine * burungij excortica-
to, hoc est, erisymi, aut vt alijs placet, melisso-
phylī, aut crucæ syluestris, quando scilicet æ-
gro famē vexato, eius seminis drachmę septē
lacte solutæ, porriguntur. Medicamentū
aliud generosum, agens lumbricos. Burun-
gij seminis excorticati, seminis nigellæ, tur-
bit cuiusq; pares modi, lupinorū, nasturtij, se-

Prolixi
gie Aëri
ier. 9. cas
39.

Alia ab
rotanū in
terpretat
tur.

PARA-IN NONVM

minis rubri ex Mechia (quod Arabes cābit
appellant) singulorū pars dimidia, oīa in pul
uerē subigunt. Exposcente aut vſu, eger per
triduū lac recēter mulctū & calidū bibet, et
deinde tertio die victu tenuissimo enutrit⁹,
cōmemorati pulueris drachmas. septē lacti
adhuc ex vberibus calenti, et aceto infectas,
assumet, idq; eō potissimū tpe, q̄ fames cruci
at. Ascarides vero vermes minuti i extremo
lōganone et ani fibula nati sūt, quāobrē ibi
dē pruritū (cui⁹ grā anus subinde infricat⁹)
excitāt. Depellūt vero huiuscemōi vermes,
lana molli oleo i q̄ porrū ebullierit, imbuta, ac
i ani fibulā cū specillo detrusa, potest aut lana
tenera citrī mali oleo, aut mētaſtri liq̄re, aut
mcmēto aloēs vaccino felle soluto, inticta, in
anū etiā subijci. ¶ De hæmorrhoidibus, scissuris

& fistulis ani. Ca. lxxx.

¶ Hæmor
rhoides.

DVm sanguis pur⁹ citra dolorē ab ano
p̄ certa iterualla emanat, minime sup
primēdus est, nisi forte sua copia laborātis vi
res deuicerit. siquidē huiuscemōi sanguis p
ruptio, multis affectibus hoc vitio detētū,
imūnē reddit. Ceterz si eō sanguine ab oris
vena

RHIZAE DE MOR. CVR.

venarum tanq[ue] ex capitulis quib[us]dā surgentib[us]
 profluente, egri robur deiecit, suppressio ex
 su erit. Proinde pastilli de iuccino, rhu ob[is] m[en]
 orū soluti, comode offerunt. Cibis aut[em] rhus
 obsoniorū in cōdimentū accipiētibus, et suc
 co immaturar[um] vuar[um] preparatis, hisq[ue] p[er] m[en]
 libus, q[uo]d scilicet alendi facultas est, rectissime
 enutrietur. Porro si vires in totū proster[n]at,
 expresso carnū, cui vt plurimū cotoneor[um] suc
 c[us], et vinū subast[ri]ngēs admixta sint, alēd[us]
 ē. Vinū q[uo]q[ue] austerū p[ro]pinandū. Præterea fo
 tinori emplastrum de spica, capite de iecoris
 doloribus inscriptum, vtiliter superaccom
 modabitur. At si hæc inefficacia fuerint cō
 fectio ex ferri stercore apparata, porrigetur.
 Ea accipit, myrobalanorum Indicarum,
 belliricarum, emblicarum singulorū drach
 mas quinque, spicæ, iunci odorati, cyperi, zin
 giberis, piperis, ammeos, thuris cuiusque
 drachmas duas, stercoreis ferri in aceto septi
 mana vna macerati, ac deinde cōbusti drach.
 quindecim, excipiunt oīa despumato melle si
 mul cū myrobalanor[um] emblicarū decocto iu
 re, veluti cap. de melācholia cōprehensum est.

M ii Huius

PARA IN NONVM

Huius iuglâdis instar quotidie exhibebitur
 ea namq; confectio, e venulis ani, & ex ijs p
 quas menses mulieribus repurgantur, ma-
 nantem sanguinem sistit. Præter hæc quoq;
 diuturno ventris profluuiò, non medicari ea
 præsidio ē. Qd si excrescentia aliqua ex-
 minens, & magnos excitans cruciatus in a-
 no oboritur, Verū a qua nihil resudat, cepe
 succū, aut fel vacciniū modica lana illitū, ex-
 crescentiæ applicato. Glandē q̄q; oblōgā ex
 malo terræ cōparatā, in anum ægri totā no-
 cte retinendā indito, & si forte fortuna glās
 ex ani fibula p̄pellitur, rursus donec excre-
 scētia incidatur, atq; adaperiatur sanguisq;
 p̄fluat, eam subiicito. Ceterū si quando cū
 vehementi dolore, inflāmatio quoq; ingens
 anū infestet, vena ægro secanda est, atq; ē pla-
 strū infra scriptū superligandum, quoniā hoc
 probe hæmorrhoidū dolorem subleuat, potis-
 simū si adlunctā habeant inflammationem.
 Accipito itaq; ad eius emplastri compositio-
 nē, iuris decoctionis meliloti, & chamæme-
 li tātisper dū tabuerint in aqua elixatorum,
 tantum quantum vola vna continere potes.

Græci cō
 dylomata
 vocare so-
 lent.

& deide oui assi luteum vnū, croci drachmā
 vnā, opij drachmas duas, seminis lini con-
 titi, foenograci, maluae syluestris singulorū
 manipulū, excipito omnia sapa hoc est, deco-
 cto vino, in quo bdellij drachmę tres dilutę
 sunt, iā postq; excrementiā superficiē oleo se-
 samī in quo gallinaceus adeps aut anatis so-
 lutus fuerit, inunxeris, prædicta ēplastri mo-
 do adhuc egelida dolenti loco admoueto, ex-
 trinsecus betę, aut lactuę folijs tuendi gra-
 tia impositis. Aliud remediū dolorē inflā-
 mationemq; remittēs. Cepam albā quā opti-
 me coctā, vna cū butyro vaccino tātis per dū
 emolliatur, conterito, & ita ambo, modice
 inferuefacta ano inflammatiōe tentato sub-
 mittito, id nāq; mirifice dolorem reprimīt.

Qd si languētis anus scissuris, (quas Grę Scissurę
 ci πρυάδες appellant) infestatur, quę excicca-
 ta aluo, ob sæcum duritiem cruciatus infe-
 runt, catapotia ex bdellio subinde propinata, JB.
 strenue auxiliantur. Quę constant, myro-
 balanorum nigrarū, chebularū vtriusq; dra-
 chmis decem, sagapeni drachmis tribus, na-
 sturtij albi drachmis duabus, bdellij mollio-

PARA. IN. NONVM

salibi tres.

7. ad Al
man. co
stat ex æ
reginis
et mellis
quis por
tioibus.

ris & pinguioris drachmīs quindecim, et
porri succo, in q̄ bdelliū subactū sit, excepta,
in cataporta rediguntur, quorum dosis idem
etidem assumpta inter drachmā vnā et quatuor
est. Si autem affectam partem ardor af-
fligit, vnguento de cerussa eam circumungi-
to. Absente quidem æstu, vnguite ex cameli
gibbi adipe, & bdellio præparato, patientem
partem illinito, quod Arabes vnguentum de
Sene vocāt. Huius autem compositio in hūc
modum se habet. Ceræ luteæ, olei sesami, a-
dipis anatis, medullæ cruris vaccini, adipis
ex cameli gibbo collecti, bdellij cuiusq; par-
pondera, bdellium seminis lini cremore sol-
uitur, & alia eo excepta, in linimentum re-
diguntur, cui nullum viribus par est. Quod
si ægrum profundiores scissuræ, a quibus
foetidum pus resudat, implicent, medica-
men acre capite de vlcerebus descriptum, his
admotueto, & vt biduum admotum sustineat
aeger, sollicitato. At si reliquæ aliquæ
per sudores erumpentes remanserint, rursus
tantisper dum locus exiccetur & nihil pro-
manet, nuper dictam medicamen superfic-
com.

commodato. Si autem ea, quæ hac in parte innascuntur in tantum prominent propendentes, ut arida ac liuida fiant, butyrum tepidum donec liuor amoveatur, subinde iis inungito. Verum si denuo huiuscemodi defluens sudor, ægrum in posterum molestat, medicamen acre & ad saniosa vlcera optime faciens iam secundo applicato. Sin autem nihil resudat, vnguento de cerussa optime huiuscemodi excrecentiis subuenies. Est

Pau. li. 6.
Ca. 79.

& quando venulæ sanguine manantes, & foris propendentes, ignito ferramento curantur, sed eius rei tractationem, propositus liber minime admittit. Cæterum inter reliquas corporis partes facillime anus fistulis tentatur, quum arcuatis & oblongis sinibus ex sua figura subiectus sit. Fistulæ autem hæ nonnunquam penitus penetrant, nonnunquam cæcæ sunt. Proinde si utrimque perforatæ fuerint, flatus & sicciora recrementa per eas produntur. Si autem vna tantum parte foratæ sunt, neque stercus, neque flatus inde prorupit. Harum autem præsidia percensere, plus est, quam suscepto hoc libro limitari posset.

Fistulae

Pulchre a
pud Pau.
li. 6. Ca. 66

Ve.

P A R A. I N. N O N V M.

Verum quia mortales pene omnes in hanc
 curationibus, quæ sæpissime in maximos er-
 rores labuntur, quibus non exiguae noxæ sub-
 sequi solent, perstringemus illis, quæ huic af-
 fectui congrua præsidia putamus, quæque ra-
 tione a prædictis sibi præcauere poterunt exe-
 quemur. Existimamus itaque fistulam virim
 pertusam, & in ano penitus delitescentē,
 nulla ratione esse ferro contingendā, siquidē in his
 ferri incisio, stercoris præter voluntatem ege-
 stionem concitat, licet & aliud quoque sit, pro-
 hibens fistulam perfossam ferramento tenta-
 ri, nimirum quum quoad vixerit eger, hoc
 in statu a ferro non lesus, permanere possit,
 nullam inde scilicet insignem uoxam præter
 saniei resudationem, percepturus. Verū si id
 quod e fistula profunditur acre & mordax
 odoreque foedum existit, cuiusque copia indies
 increfcit, fistula putrida quæ herpetem exe-
 dentem sibi comitem habet, egrum infestat.
 Cui medicamine acri, erodentem, & deinde
 deperditam carnem restituente, priusquam
 malum dilatescat augeaturque, subuenire de-
 bes, antea tamen leuiore quopiam tentato.

Porro

Porro si id quod resudat exiguum, nec mor-
 dax, nec odore foedum fuerit, siq; malum nō
 cōserpserit, nulla inde prāter resudationem et
 influxum habenda suspicio est. Poterimus ta-
 men huic tantisper dum exiccetur, & subse-
 derit, & nisi per longa interualla quicquam
 resudauerit, subuenire, atq; rursus vbi sanies
 emanauerit, prāscriptum medicamen ad fi-
 stulas, huic quoq; fistulae accommodare, eaq;
 ratione tota aegri vita, blandire illi nitemur,
 nullam inde notabilem noxam a grotante
 percepturo. Ratio autem administrandi me-
 dicaminis hanc censeo. Ante omnia fistu-
 lam, donec quicquid in ea conseruatum sit
 profluxerit, comprimito, deinde collyrij ca-
 pite de oculi fistula inscripti, portionem ali-
 quam succo plantaginis, aut pluuiali aqua
 laeuigato. iam si fistula specillū recipere pos-
 sit, specillum molli lana inuolutum hocq; li-
 quore imbutum, fistulae imponito. Si autem
 ob angustiam, aut loci distantiam, fistula spe-
 cillum recipere nequeat, resupinato aegro al-
 troq; foemore puluinari incombente, colliri-
 um succo plantaginis, aut illi simili solutū,
 gutta

PARA. IN NON VM

Guttatim p̄ interualla fistule immanare sicut
to, Hoc quidem tribus infecutis diebus ma
ne, & sub vesperā, opportune perages. Præ
terea in aqua æneo vase calefacta infellus, &
ex eadem lotiones, ex usu erunt.

Ani.

¶ Ad procidentiam ani & vuluæ. Gal. lxxxi.

Si anus inflammatione liber p̄cidit, itaq;
se habet, vt impulsus in pristinū locū p̄
trudi ac retineri queat, sumito cerussę, balau
stij, gallarū, aluminis, stibij singulorū pares
modos, & ea in tenuissimū pollinem deteri
to, procidentiq; ano inspargito, ipso prius o
leo rosaceo calēte circūlito, aut vino austero
deterso. Deinde suo loco repositum anū, deli
gato. Id tamen proprij time postq; ager ex
creuit, tentabis, ne statim ad egerendū neces
sitas ipsum vrgeat. Sumuntur quoq; ad præ
sens vitiū, gallę balaustia, glādularū calices,
myrri folia, quę simul aquę donec ea rubescat
incoquant, & deinde ex huiuscemōi decocto
infellus, & lotiōes parant. Ceterū si an⁹ ob
inflammationē tumidus, imponi nequeat, e
ger in aquā calidam conscendet, & ei ad tē
pus immorabitur, atq; anū cera, cui chama
melinū

linelintū oleū, aut anethinū contemperatūste,
 collinere quousq; reponi queat consilium est.
 Postq; vere recēdi pōtēst, supra præsēcriptis
 astringēdi vim possidentibus pulueribus,
 & fascijs illi rei adaptatis, vtendū erit. Vt
 rus vero si declinauerit, eadē ratiōe illi sub-
 uenire decet. At in hoc vitio vinculis fortio-
 ribus vri, & agram supinam & eleuatā for-
 minibus n̄sq; sibi mutuo innitentibus, de-
 cumbere, necessarium est.

Vulua.

Graciat
 id pestis
 astringenti
 b^o vtatur

¶ Ad menses confertim erumpentes sistendos.

Caput. lxxxii.

Immoderate profluentibus mensibus re-
 tinendis, pastilli ex succino, astringente
 quopiam liquore laeuigati, atq; septimana v-
 na ita propinati, optime faciunt. Quibus si
 non conqueuerint, confectio quæ ferri ster-
 e^o accipit, exhibebitur, & vena cubitū perre-
 ptans, opportune (partita interim sanguinis
 missione) incidetur. Cucurbitulæ quoque
 sub mamillis infigendæ sunt, & cibis au-
 steris vtendum. Summe etiam facit medica-
 mē hoc in ægre sinū immissum. Thuris, bā-
 laustij, gallæ, stibij, acaciæ, aluminis singu-
 lorum

Ob tenuē
 et morda-
 cē humo-
 rem.

lorum eque portiones, his in tenuissimū pol-
linem redactis lana quæ ad pectus sat est,
eo puluere circumlinitur, ac ita in mulieris
pudeudum inditur. Epithemata quoque capi-
te de ventris profluio comprehensa, ingui-
nibus & lumbis inducere, & in aquam æ-
neo vase calefactam conscendere, opportunū
est. Porro si hæc non profuerint, acutior pes-
sus, ut qui crustas inducit, in uteri collum
diutius retinendus, subijcitur.

A costipa-
tis frigore
meatibus,
aut crasso
sanguine,

IV.

Dozch
sup: pag
18
Cæcilia
factida;

VB:

¶ Ad suppressos menses citandos. Ca. lxxxiii.
¶ Vm menstruæ purgationis strangula-
turi magna subsequitur noxa, pastillos
ex myrrha porrigito. Recipiunt autē. Myr-
rhæ drachmas tres, seminis lupini adamussi
contriti drachmas quinque, foliorum rute, me-
tastrī, pulegij, cumini, rubiæ sativæ qua ve-
stes inficiunt, liquoris Syriacici, sagapeni
opopanacis singulorū drach. duas, his bacca-
rū iuniperi iure subactis, informant pastilli
duarum drachmarum pondere, & vnus iu-
re decoctionis baccarum iuniperi detritus,
in die exhibetur. Sane hoc medicamen adeo
inducendis mensibus pollet, ut etiam foetus

educat

educat, & inter primos dies conceptionem facile impediat, si quæ eo identidem vtatur.

Ad hæc cucurbitulas popliti agglutinare, ac venam interiorem malleolum perreptantem, aut poplitis incidere confert. Postremo foeminibus cucurbitulas cum cutis incisiõe defigere, non infimum auxilium præstat.

¶ Ad uulvæ scissuras. Caput. lxxxiii.

His curandis, medicamen ani rimis, seu fissis sacrum, ex usu erit. Præparatur quoq; ad idem pessus ex anatis adipe, cesp. po hoc est, lanæ succidæ sordibus, cruris ceruini medulla, hæc cera oleo lilij, aut narcissi subacta excipiuntur, atq; ex ijs formatus pessus in ægræ sinum dimittitur, dummodo neq; febris, neq; ardor egram molestet. Quoniam si rimis æstus cum erosione adfuerit, oleum rosaceum illitum optime facit, nec min^{us} quoque ex cerussæ vnguento pessus, subdit^{us} iuuat. At si vehementior calor egram affligit sumito portulacæ, aut lactucæ succum, aut herbæ pulicaris seminis cremorem, fingitoq; laminam plumbeam leuitati marmoris cui colores interuntur similem, & illi in
circul

PARATIN NONVM

circuitu labrum inflectito, ac deinde dicto-
rum succorum aliquem lamine infundito, &
correspondente leuitati pistillo plumbeo, la-
minam donec succus debitam spissitudinem
recipiat, plumbiq; non exigua portio ipsi ad-
miscetur, terito. Iā & illi succo rosaceū oleū
admisceto, ac informato pello, in ægræ sinū
ipsū subiicito. Hoc enī remediū vteri cācro
exulcerato, eiq; cōsimilib⁹ vti n̄s auxilio est.

Ætius
μολυσ.
δουχου-
αόρ uocat

¶ De vuluæ inflammatione. Caput. lxxxv.

¶ alias hu-
merali.

Inflammationem si febris ardorq; conco-
mitetur, sanguis ex † axillari misunden-
dus est, & ægra p̄isana enutrienda. Rehi-
bus quoq; & lumbis, & foemoribus, & su-
mini epithemata calidioribus tumoribus di-
cata, superaccommodabimus, & locum alijs
refrigerantibus (a forti ligatura abstinentes)
vehementer infrigidabimus. Verum si fe-
bris & æstus conquieuerint, ac aliq; inflā-
mationis calidæ reliquæ in duritiem occal-
lescentes supermanserint, liquidis & emolli-
entibus vñtionib⁹ ac iniectionibus per in-
feriora vtendū erit, & mulier in decocta sup-
purandi emolliendiq; vi pollentia desidebit.

Apud Ga-
2. de arte
curatiua,
reputiēs
ēplastrū.

Pessus iduratas vteri inflamationes emolliēs, *Vulue duricie & morientibus*
 ac ei⁹ cruciatib⁹ leniēdis pedetentiq³ sedādis
 quā aptissimus. Adipis anatis, medulle cru-
 ris ceruini vel vaccini, bdellij, molliusculi, cro-
 ci, lutel oui assi, facis olei semis lini, fecis o-
 lei lilij figulorū pares modi, subigūt in sapa,
 aut alio quis dulci vino, figitq³ pessus dolori-
 bus mitigandis & vulue duricie emollien-
 dis, maxime opportun⁹. Cōducūt prēter hęc
 infellus in decocto foenogræci, seminis lini,
 chamemeli, meliloti et brassicarū sūmitatū,
 quę singula p se, aut simul omnia iocoquūtur.

¶ De exulceratione, abscessu & cancro uteri.

Caput. lxxxvi.

VTeri exulcerationē testat pus, aut sanies
 a vulua pfluēs. si itaq³ prōpta in cō-
 spectū venerit exulceratio, et pus aut sanies
 a primis partibus pfluxerit, nullaq³ cauitas
 foeda putridaue egrā molestauerit, accipito a-
 loē, thus, myrrhā, cinnabarī, sarcocollā, et ea
 in pollinē detrita, laborāti parti inspargito,
 tātisper dū solutionē vnitatis puluere illo re-
 stitutā videas. Aut eū puluerē liqre aliquo
 pfluū, i vnguēti formā redigito, ac ita vtere.

Sin

PARA. IN NONVM

Sin autem alte pus profluit, pello ad sanguinis & puris eruptiones inscripto, & succo plantaginis soluto, in vterū clysterem infundito. At si quod effluit foedū malignoq; odore fuerit, pessum secūdū priore acriorē dictoq; modo leuigatū, in vuluam indito, prius tamen vtero mulla per æneū oricularium clysterē immissa, abluto. Porro si præter materiæ fluxū, cruciat⁹ pūctiles & tumor durus, qui tactu deprehēdi possit, adsint, magno studio ne locus acrioribus irretetur, præcauēdū est. Proinde succo plumbi, quē attritu supra apparauim⁹, aut cerussę vnguēto opportune vtemur, venāq; cubitum perreptantem vtiliter incedemus. Est præterea ægra ab his quę atram bilē accumulare solent, & aromatib⁹, & seminibus calidioribus, & incidentibus, quibusq; cōdita calidiora apparari solent, arcēda.

¶ De vuluæ strangulatu.

Caput.

lxxxvii.

Ex vitiato
semie, aut
mensibus.

SI quando mulierem diutius sanguinem menstruū retinuisse acciderit, ac ad multum interuallū virū non admisisse, quum tamen ad venerem ea procliuis existerit, præ-

tere.

tērea si grauitatem & dolorem in demissio-
ribus luminis partibus perceperit, ad hęc si
quendam veluti ad superiora ex pubis parti-
tibus contractum senserit, animi deliquium
fortasse hęc comitabitur, & veluti emortua
morboe comitali correpta mulier proster-
netur. Vnde quoq; ægerrime eam aērē in-
spirare, vel arterias pulsare, percipiemus. Et
forsitan his accidentibus oppressa suffocata
peribit, fortasseque (licet difficulter) sanitati
recolligetur. Quapropter hūc affectum sta-
tim atq; implicat propellito. Incipito itaq;
curationem, a pedum, & crurum frictio-
ne, eorundemq; dolorificis vinculis astrictiōe,
secundum hęc per magnarum cucurbitarū
in pube, & foeminibus agglutinationem.
Obstetrici quoque digitum odorato oleo in-
tingere præcipite, vt eo in vteri collo inserto,
& peniti⁹ quasi ad vuluę os demisso, circū
linitu, & titillatione, corruptum semen eli-
ciat. Naribus etiam struthium inspirādum,
ac auribus† platæ voces sonore inclamādæ
sunt. Item nihil iucundo gratoue odore pol-
lenis naribus admouendum, imo odorata, cu-

Dū est sa-
tis virum
Cel. venā
secat.

† Alique
certas ridi-
culas vo-
ces præ-
scribunt.

N iusq;

Pli. addit
capillos
mulieris
cremzatos

ius generis gallia moschata est, recte abij-
ciunt. Inguina aut, ac illis contermina loca,
odoratis epithematis foueto, & ea quę tetro
foedoue odore sunt, naribus inducito, cui⁹ no-
ta sterc⁹, castor u, sulphur et extinctu ex lu-
cerna linimentu, cēsentur. Ceteru muliere
valetudini restituta, iā cōprehēsis prēsidijs,
ne denuo affectus exerceat, eā a noxa præsē-
uare profuerit. Proinde si morbus post men-
siu suppressionē nascat, ea quę mēsisbus ciē-
dis sunt præbeto. Itē e pedis venis sangui-
nē detrahito, inguinibusq; ac coxis, cucurbi-
tulas affigito. Perro si post diu intermissum
concubitū (q; subinde huius mali autor esse
consuevit) huiuscemodi noxa intraserit, sum-
me auxiliabit cū viro coitus, aut si eius occa-
sio non datur, obstetrix pręscripta ratioe in-
terpositis interuallis semē prouocabit. Vel
semē extinguetia, quę suo loco executus sū,
offerto. Itē pastillos ex myrrha capite de ci-
tādīs mensibus inscriptos porrigito.

Ex mulie-
bri semine
et affluēti
b⁹ mēsisb⁹.

¶ De mola uteri. Ca. lxxxviii.

Interdum mulieres affectus quidam an-
git, qui per initia concepti foetus suspi-
cio

tionem adfert, illis enim venter intumescit,
 & decolorata apparēt, mensesq; supprimū-
 tur. Motus iamēn qui in hoc morbo est, ab
 eo qui ab infantibus fit, dissimilis percipit,
 mola namque digitis violēter iniectis, a suo
 loco dimouetur. Cæterum circa finem mali
 cum magnis laboribus doloribusq; infor-
 mem aliquam carnēā massam, non aliter q̃
 si parerent, educunt. Interim autem interdū
 soli flatus, & humbrum copia ab vtero pro-
 rumpunt, vnde venter sidere solet, atque e-
 numerata symptomata ab egrotāte auferri.
 Perro postquam tempus, quo foetus vtero
 gesti moueri solent, lapsū est, pastilli ex
 myrrha seminum incidentium decocto læ-
 uigati propinandi sunt, oleumque † balla-
 mi inguinibus, & vteri collo inungēdum.
 Ad hæc pessus, qui ruta et mērastro cōstāt,
 & alios capite de mensium prouocatione,
 foetusq; educatione conscriptos, subiicere con-
 uenit. Quantitas quoq; catapotiis foetidis
 vna vice porrigendis, inscripta, pluries pro-
 pinabitur, siquidem his omnibus, affectæ
 propediem liberabuntur.

Quæ mola
educunt,

† alias chel-
sim hoc ē
ligustici

ARAR. IN NON V. M.

Laxato,
aut rupto
ad uasa se
minaria
peritonæ
o.

¶ De ramicum generibus. Ca. lxxxix.

SI alicui in abdomine pars aliqua promi
net, quæ resupinato egro, & leniter digi
tis parti admotis, sedit, quæq; rursus seden
te egro, prouoluitur, affectus ramex dictus e
grum molestat. Quæcirca hoc morbo impli
citus, a vehementi motu, nempe cursu, saltu,
clamore & id genus alijs, præsertim post in
gestum cibum, cohibendus est, ac a fabarum
& imprimis phaselorum, lenticulæ, oleorū
horumq; quibus inflandi vis adest comme
stione, omnino arcendus. Verum inter cæte
ra maxima laboranti sollicitudo, ut alu⁹ cita
fluat, habenda est, siquidem ea ratione, fortal
sis quo minus doleat præcauebit. Præter hæc
loco deligaturam conuenientem, præcipue
dum occasio motum præcipit, accommodare
confert. Tamen si vehementius venter emi
net, & grauat, a motu omnino abstinendum,
nisi forti fascia inguinibus præcinctis. Em
plastrum ad ramicem. Gallarum cupressi v
triusq; partes duæ, myrrhæ, cyperi, sapsuchi,
acaciæ, thuris, gummi Arabici cuiuslibet
pars vna. gummi vino leuigatur, & reliqua

in puluerem probe coacta, illi adijciuntur,
deinde contusa, & resupinato agro admota
recte deligantur, & insoluta ad † triduum,
aut quatrimum sinuntur. Tunc itaq; rur-
sus supino procumbente egro, fascia laxatur,
eozq; emplastro abiecto, aliud in eius vicem
applicatur, ea namq; ratioe ne dilatescat ma-
lum, cauetur. Quum ramex ad testes perti-
net, scrotum increfcit ac intumet, idq; vel ob
coaceruatos flatus, vel quempiam humorem
ibidem collectum, aut propter intestinū ali-
quod in eam partem deuolutum. Si itaq; ob
prolapsum intestinum contingit, grauis &
excrutians, tactuq; indolens ramex erit.
Proinde illi eandem quoq; quā prescrip-
tus victus rationem instituemus, ac paulo
ante dicto emplastro superaccommodato, lo-
cum continuo fasciis constringemus, liqui-
dem ramex vinculis non compressus, indies
magis dilatescit augeturq;. Si vero ob coa-
ceruatam humoris colluuiem euenerit, locus
lucidus, tersus ac intensus conspicitur. Huic
itaq; aquoso ramici epithema a capite de aqua
subter cutem ad ἄρκιτον descriptum, circum-

† alias ad
sex, aut se-
ptē dies,
nec male.

P A R A. I N N O N V M

linendum, aut potius emplastri modo super
accommodandum. In hoc praesenti affectu,
aqua interdum ad inferiora procumbit, per
que etiā nonnunq̃ resudat, & aliquando par
te scalpro pertusa, profluit, quibus occasio
bus eger ad tempus malo liberatur, at tem
poris successu morbus repetit. Proinde post
effluxum humorem, egrotanti ignitis feris,
& medicaminibus strenue siccantibus ac a
stringentibus, succurrendum est. Quoniam
illorum remediorum usu, mali restitutio fit,
nec alias huiusmodi noxa acri tentantur.
Cæterum harum manualium curationū tra
ctatio, propositi libri institui non est.

Apud Pau.
li. 6. Ca. 62.
Cel. li. 7. ca
23.

Quando autem huius affectus, flatuosus spi
ritus autor est, locum perfricare bene facit,
& oleo sambucino in quo castoreum & eu
phorbium laevigata sunt, recte pars tumida
subungitur, ac in penem quoq̃ guttatim hu
ius portio, commode per syphonē instillat.

¶ De podagra, reliquisq; articularijs morbis

Caput .xc.

A calidi
humoris
alluxu.

SI quando articulos dolor cum tumore
exercet, & tactu locus calidus, coloreq̃
rubro

rubro perfusus percipitur, agrotanti si
 dextro pede laboret, ex extrema dextra ma-
 nu, aut cubito, si sinistro ex summa leua
 manu, aut cubito, sanguinem detrahito.

Partem quoque affectam, ad reprimen-
 dum humorum influxum, doloremque re-
 mittendum, hoc epithemate irrorato.

Rosarum rubrarum, sandali rubri, nucis
 Indicæ, glaucij succi præparati, lapidis Ar-
 meni, opij singulorum æquæ portiones,
 his aqua & aceto subactis, epithema indu-
 citur, ac ne concalescens noceat subinde repe-
 titur. Item herbæ pulicaris semen aceto ma-
 ceratum, & chartæ, vel alicui linteo ad id
 idoneo inductum, tantisper dum tepuerit,
 dolenti parti superaccommodato. Quando
 autem tepuerit, illo amoto, in eius locum
 aliud applicato. Ad hæc alluum myrobala-
 norum & hermodactylorum sive deijcito.

Præparabis autem huiusmodi ius hac ra-
 tione. Accipies myrobalanorum citrinarum
 drachmas quindecim, pulueris turbit, oleo
 amygdalarum dulcium circumliti, filicule
 quam Græci πολυπόδιον vocant) vtriusque
 drach

PARA. IN NONVM

drachmas tres, foliorum arboris senæ drachmas quatuor, feminis fumarie herbæ tantundem, hermodactyli albi, feminis intybi, feminis apij, rosarum singulorum drachmæ duæ, omnia in tribus libris aquæ, ad duarum consumptionem decoques, & insuper manibus adamussim confracta percolabis, ac eius excolati iuris vncias sex, aut septem cum sacchari albissimi drachmis decem, prospere porriges. Verum si quis presens decoctum fastidiuerit, catapotia præbeto, quæ lecto decumbentes surgere, moueri, & obambulare faciunt. Compositio quidem eorum in hunc modum se habet. Aloës drachma vna, scammonij & obolus semissis, rosæ rubræ contritæ obolus vnus, hermodactyli albi drachma semis, redigito hæc in catapotia, ac vna vice porrigito, habito interim respectu virium ægroti. Ceterum eger cibis infrigidantibus, & austeris enutriendus est, & a vini potu & carne, hisque quæ melle parantur, circumcindendus. Cum vero tumoris ardor inflammatioque conquieuerint, his quæ calidioribus tumoribus discutiendis sunt, affectus sanabitur.

Interpres male quartam partem drachmæ vertit.

tur. Eius quidem notę hoc est. Cera oleo lilij soluta, succo fœnogreci, & seminis lini commiscetur, simulq; ad debitam mixturam pistillo teruntur, & deinde epithematis instar, egrę parti accommodantur. Interuallis vero quibus sanus, ac ab accessionibus eger liber est, venę sectione circa tempus quo malo torqueri solet, & potissimum in vere est vřdum, ac aliis his quę flauam bilem purgant deijcienda, atq; a vini, & eorum quę melle apparantur, & carnis vsu abstinēdū. Proinde cibis acidis & austeris hisq; frigiditate paribus, enutrietur. Porro partes huiusmodi vitio cruciari solitas, paulatim a consueto exercitio, dissuescere confert, idque potissimum, dum accessionis tempus expectatur, & corpus & venę sanguine turgēt, & si a venę sectione, atq; alui solutione, ad longum interuallum æger sibi tēperauerit.

Cæterum si quando articulorum dolorē neq; ardor, neq; rubor concomitetur, & eger frigida temperie sit, locusque tactu algidus percipitur, inter curationis initia, catapotia maiora de hermodactylis porrigenda sunt.

Huius morbi p̄seruatio.

A crudo humore.

Quorum

PARA IN NON NV M

Quorum mixtura talis est. Hermodactyli, satyrj, chamælex cuiusque drachmæ quinque, hieræ picræ drachmæ decem, cucurbitæ sylvestris, centaurij minoris virtusque drachmæ quinque, euphorbij drachmæ duæ, turbit drachmæ decem, thapsiæ Indicæ, zingiberis, sinapis, piperis, castorei singulorum drachma vna; omnia simul rosarum melle excepta, in catapotia digeruntur, horum pondus a drachmis duabus cum semisse, ad tres datur. Sane mirifice hæc catapotia prosunt, siquidem ægre surgentes ad ambulationem promouent.

Vtuntur
multi cat.
Me. ex her
mo. quia
non adeo
vehemen
ter,

Epithema ad frigidum pedum articulare morbum, efficax. Styracis liquida, castorei, euphorbij, myrrhæ, aloës acaciæ singulorum equæ portiones, his vino veteri affuso, formatur epithema. Cæterum dolore se remittente, laboranti calidæ aquæ ab alto instillatione, & olei liliorum inunctione, prospere subueniunt. Emplastrum præterea ex bdellio molli, styrace, foenogrecæ, semine lini & ammoniacæ preparatum, vtiliter dolenti parti inducemus. Adaptabimus autem id ad hunc modum

RHAE DE MOR. CVR. 102

dum, ammoniacum cum bdellio vino veteri
diluius, ijsq; linteo aliquo accommodatis,
loco instar emplastri superponemus.

Id Tophi arti-
culorum,

quidē articulorum vitium, quod in lapide-
am duritiem occallescit, quodq; cola, & ar-
ticulamenta tophis adimplet, presentis af-
fectus, de quo iā paulo ante locutus sum, spe-
cies censetur. Quare quoq; hoc vitio impli-
citos a fastidiosa ciborum repletionē, frigida
de potu, cibis glutinosis et crassis, & crebra
remulētia, merito arcere cōuenit. At postq̃

Malia fri-
humore p̃
seruatio,

sanitati restituti fuerint, mediocri exercitiū,
præsertim ante cibū illis imperandū est, & a
venere imprimis ventriculo cibis distenso,
sunt cohibendi. Ad hęc a balneo dulcisaque
abstinere, & post assumptos cibos quiescere
consilium est. Potui vero eis vinum merum
et vetus, & ea quę vrinas citāt medicamīa,
dū sani viuūt, porrigēt.

Coxēdix.

Affect⁹ a parte im-
plicata coxēdix apellat⁹, is dicit⁹, q ab osse la-
to et coxēdicis p̃ formur ad gēua vsq; p̃tēdi
q; q; nōnūq; etiā in lōgū virgē instar, p̃ totū
crus dimiss⁹ ad sūmū vsq; pedē p̃git. In hoc
etq; affectu, si i tēpie calor p̃guallet, vīdēt⁹

abū

A sāguie.

colora

PARA. IN NONNVM

A crudo
succo,

coloratae sint, sanguis primū vena cubitum
perreptante lateris dolentis pertusa, ob ple-
thoriā, minuendus est, deinde poplitis, aut ea
que exteriorē malleolū perreptat, diriuatio-
nis grā secta, opē fert. Item ea que ad calidū
articularem pedum dolorem inscripsimus,
inducere parti affectę, summopere confert.
Cæterum si eger frigida temperie fuerit, co-
lorq; exalbidus & aque subter cutem simi-
lis, subinde raphani decocto, & syrupo aci-
do, vomitum irritato. Coxā vero, & fœmur,
& tibiā totam oleo in quo castoreum, eu-
phorbiū & styrax leuigata sunt, cōtinuo in-
ungito. At si coxendicis dolor diuturnus et
solutu cōtumax fuerit, ægrotāti clysteres ex
muria Nabathææ & nitro præparatos, in-
fundito. Collyriū quoq; ex cyclamine & syl-
uestri cucurbita cōiectū, & raphani & cepe
decocto solutum, quousq; locus leniter exul-
ceretur superaccomodato, quoniam papulis
conciatis, affectus subinde restitui consue-
uit. Si vero morbus in vetustatē inciderit,
sumito sinapis, & stercoris colūbini æquas
partes, & eas tritas ficuū decocto excipito,
ac

ac in morem emplastri coxendicis regiōi su-
perinducito, ac tantisper dum ex concitatis
vesiculis sanies profluat, finito, & deinde lo-
cum aqua calida irrorato. Post hæc diebus
aliquot, agrum a medicaminum usu immu-
nem reddito, siq; sanitati nō restituitur, ean-
dem curandi rationem repetito, ac ita egro-
tanti succurrito. Porro si affectus diuturnus
ad multū tempus exercet, suspicioque sit lu-
xationis capitis fœmoris ex coxendicis costi-
le, ob viscosi humoris vitiū, aut si articulus
iam luxatus fuerit, ad vñionē descendere o-
portet. Proinde ferreo instrumento instar ro-
tæ adaptato, lccum circa articulationis late-
ra vrito, & in lati ossis summitatis, ac fœ-
moris capitis cute, ignito ferro aliam cru-
stam inducito, prioremque ea ratione auge-
to. Verum huius rei tractationem præsen-
tis libri termini haudquaquam admittunt.
Præter aut oīa iam comprehensa, dū valet æ-
ger, vomitum sibi familiarem reddet, ac ala-
uum facile respondentē, sibi procurabit. Præ-
terea victus rationem (crassos cibos multā-
que temulentiam a se arcendo) extenuabit.

Ad

Recentio-
res Græci
tres cru-
stas vñt.

PARA. IN NONVM.

¶ Ad incipientem gibbum. Caput. xxi.

Ab humo
re frigido,



Vum gibbus primū nasci coepert,

¶ alias bal
sami,

catapotia maiora ex hermodactylis
porrigito, ac subinde olei † ligustici drach-
tres, cum seminum calidorum decocti vncijs
tribus, propinato. Ad hanc partem oleo sam-
bucino in quo styrax liquida, castoreum, eu-
phorbium subacta sunt, illinito, & a crassis
refrigerantibusq; cibis, agrum arceo. Præ-
terea aquam calidam, cui mentastrum, sam-
psuchus & stichas Arabica, seu gallica inco-
cta sint, parti ab alto superfundito, in super
frequentes frictiones, atq; ex calidioribus o-
leis inunctiones, tentato. Quod si hec mor-
bo correptus puer fuerit, in calidam inessus,
ac ex iam enarratis oleis inunctiones, abun-
de auxiliabuntur. Verum si nunc primū
nascentem gibbum febris concemitetur, a
iam dicta curandi ratione. plane est disceden-
dum, & ex herbis infrigidantibus decoctum
cū cassia fistula potui propinandum. Item ve-
na quoq; axillaris percutienda, atq; empla-
stra ad dolētē locū vsq; vi sua refrigerandi per-
reptantia, affectę parti superaccommodanda sūt.

Ab inflam-
matione,

De varicicibus. Caput. xcii.

SI venę dilataę & turgidę et varijs orbi-
 bus implicata viridioresq; in crure et
 spiciant, affectus a plerisq; vitis appellatus, ob
 similitudinē quā cū vitis maioribus ramis,
 inaequaliter distributis habet, hominē affi-
 cit. Quo morbo multos labores pedibus subi-
 re soliti, cibisq; melācholicū sanguinē coacer-
 vantibus copiose se implētes, subinde offēdū-
 tur. Inter initia itaq; pręsidiōrū venā axilla-
 rē incidere expedit, ac his quę bilē atrā edu-
 cūt, quorū capite de melācholia minimus,
 aliu⁹ rectissime subducetur, Et hęc pluries re-
 iterāda sūt, & ab omnibus a qb⁹ melācholi-
 ci arcētur, omnino pręsenti affectu impliciti,
 cōhibēdi sunt. Pōstq; aut ad dies aliquot prę-
 scripta curādi ratione vti sumus, sanguinis
 detractiōnē e venis cruris itumescētib⁹, mo-
 liri opportunū erit, ex quibus sāguis manare si-
 neā, tātis per dū quidqd in illis collectū sit, ef-
 fluxerit. In summa igitur, q; grū bilēm atram
 euacuandis vii, venam q; axillariē peritū de-
 recōfrit, p̄inde & ab omnibus melācholicū
 succū generātib⁹, abstinere opportunū est.

A crasso et
melancho-
lico sangui-
ne.Excludnu-
tur iterdū
varices, vt
apud Pau.
l. 6, ca. 82.

De

PARA. IN NONVM.

¶

De elephantia.

Caput. xciii.

Hic affectus postquam penitus radices infixerit, nunquam curationem admittit. At si recens adhuc malum est, & manū quis ei recte adhibet, eoque quo debet modo, præsidia applicet, restituitur, aut saltem ne inualescat augeaturque, illi prospicitur. Quando itaque crura intumescunt, totusque habitus atro colore suffunditur, & venæ quas varices appellant apparent, frequentem vomitum imperare conducit, similiter quoque a nimia obambulatione, & a recto corporis statu abstinere cōfert. Præterea venter secundum vomitum, catapotijs maioribus ex hermodactylis ducendus est, & deinde vomitus reiterandus. Hæc namque subinde repetita iuuant, & æger a crassorum esu, vtiliter arcetur. Item tibiam totam ligatura intercipere conuenit, idque vinculo prius in calcaneum iniecto, atque ita sursum ad genu deducto. Verum ante ligationem, epithemata ex aloë, myrrha, acacia, hypocistide, & alumine, simul omnibus in aceto acri detritis, præparata, cruri admouere ex usu est. Venam quoque interiorē cubi

ei si

si si res expostulauerit, manus oppositæ incidere oportet. Caueat etiam ne rectus stet, nisi vniuerso crure exactissime deligato, & nulla ratione ab huiuscemodi epithematum usu, abstineat. Item vomitu quoque identidem vtatur. Quod si æger statim a vomitu quietem petat, is brassicarum seminibus stichade Arabica, sarmentorum cinere, lupinis, nitro, caprino stercore, fœnogræci farina, simul in salita aqua decoctis, euaporandus est. Præterea vno atq; altero die ex ligno fœtus, optime facit, nam hoc propositus affectus, præcipuam partem discussit aut saltem illum leniorem mitioremq; efficit.

¶ De lumborum rubore seu exulceratione.

Caput. xciii.

Cum quispiam diutius supinus dorso incumbit renum regio rubet, vnde & parua, vlcuscula nonnunquam eueniunt. Quando itaque rubor intendi conspicitur, milium, aut panicum, aut salicis folia substernenda sunt, ægerq; frequenter ab incubitu subleuandus est. Ac hæc loca rubentia aqua rosacea niue refrigerata, irrorare euenti

Ita, ma
ligna.

PARA IN NONVM

Li. 7. ad
Alma. ca.
20.

lareque conducit. Verum calore non con-
quiescente, epithema Arabibus alhybrati di-
ctum ex aqua rosacea, camphora & aliis o-
busdam refrigerantibus succis preparatum,
veluti capite de phlegmone descriptum est,
summa utilitate superaccommodabitur.

Vel succus plumbi, supra ad vuluæ scissu-
ras inscriptus, utiliter loco inducetur. Iam
si papulæ, atque exulcerationes oboriantur,
unguento quod cerussa constat circumlita,
restituentur.

¶ De doloribus extremarum, summarumque
partium. Caput. xcy.

DVm dolor aliquis, manum aut pedē
exercet, æger interrogandus est, an is
illi ex ictu, vel incidente quopiam corpore,
vel diuturno in partem innixu, vel alia qua-
cumq; manifesta causa, euenerit. Quoniam
si eius doloris externa causa auctor non fue-
rit, affectum locum intus oportet, an ne sci-
licet cæteris partibus plus minusue rupeat,
siquidem si vniuerso corpore magis rubore
suffusus fuerit, præsidia phlegmoni dicata, ex-
usu erunt. At si neq; calidior, neq; sanguino-

sentior percipiatur, sed si indies liuescat exci-
 ceturque, aquam calidam ab alto illi instil-
 lare confert. Item cera oleo macerata, inun-
 cta, & tantisper dum conquieuerit dolor, in
 parte relicta, subsidium præstat. Cæte-
 rum si pars subhumida, manuum tactui sub-
 frigidam temperiem referat, subinde eam
 infricare expedit, ac aquam calidam in qua
 sampsuchus, chamemelum & stichas Ara-
 bica ebullerint, parti infundere, vti iam di-
 ximus, vtile putatur. Dehinc oleo & lutea-
 rum violarum, quæ antiquis parietibus in-
 nascuntur, locus irrorabitur. At æger vi-
 ctus rationem extenuabit, multoque exer-
 citio vtetur. Item in laconicum primam
 balnei decimum, vt sudorem preuocet, vtiliter
 ingredietur. Verū si hæc inualida fuerint,
 alius serosum succum expurgantibus seme-
 dijs, ducenda est. Pars præterea si tactu fri-
 gida experiatur, primum fricanda est, deina-
 de oleo costino, & sambucino, & oleo glan-
 dis vnguentariæ, & his viribus paribus, mo-
 diceq; inferuefactis, circumlinetur. At si hæc
 quoq; inefficacia fuerint, vnguentis, capite

Li. 2.
 Almag.
 106. A.
 05

Offici-
 na cheiri
 vocant.

PARA. IN NONVM
de neruorum resolutione compræhensis, do-
nec probe omni molestia æger libe-
retur, inter vngendū
vtemur.



FINIS Paraphraseos in nonum Rha-
zæ ad Regem Almanforem, de affectuū sin-
gularum corporis partium curatione,
per Andream Wesalium
Bruxellensem.



ANDREAS WESALIVS

Bruxellensis Candido

lector S. D.

Vereor Optime lector, undecumque delicatioribus auribus satisfactum non esse, quum interdum in hac nostra paraphrasi uoces quasdam ab Arabibus, & fere omnibus nostri temporis Medicis in medendi usu ritas reliquerim, quæ tamen nec uere latinæ dici possint, nec ab eruditis, in latina lingua scriptoribus (Plinium dico, Celsum, Largum, Varronem & Columellam) receptæ sint. Quare te hac succincta & extemporanea epistola admonendum duxi, non id ubique, sed interdum & necessario factum, nimirum in quibusdam simplicium medicaminum Græcis illisque autoribus incognitis nominibus, & aliquibus compositorum medicaminum formulis, cuiusmodi sunt, myrobalanorum Arabibus usurpata genera, tamarindi, camphora, iuleb, syrupus, electuarium, aliæque (si quæ reperiantur) similia. Quidquid tamē sit, nullam omnino eius generis relictam existimo, quam nō alibi in libri marginibus, quibus interdum lectori consule re statui, aut orationis serie, prout res postulare uidebatur, explicauerim, meumque quid de ea sentire iudiciū ad scriberem. Neque uero me fugit esse nonnullas, quæ latine quidem

EPIST. AD LECTOREM.

quidem græcè exprimi potuissent. Sed quoniā autores
de his parū inter se consentire uiderentur, satius putavi,
eas quoque quales reperisse, relinquere. Talia sunt, turbit,
spodium, & si quæ ijs sunt cognatæ dictiones, quas ta-
mē omnes huiuscemodi fere nota s̄ uel sentiel saltem si-
gnari curauimus. Præter quam, & hæc F in ipso con-
textu dictionisque serie collocatas reperies, ut nimirum
intelligas, quod quidquid his includitur, id RhaZ & om-
nino non sit. Quamquam nec omnia, quæ paraphrastica li-
bertate interieci, his statim quoque characteribus teu ter-
minis intercipienda duximus, at ea dumtaxat, in quibus,
aut propter prolixitatem, aut nouam inuentionem, a mo-
rosiori quopiam petulantioreque linguæ incusari possem.

Licet & id rarius, quum paraphrastes, nō autem
interpretis officium insecutus sim.

Vale candidissime lector, & hunc

nosstrum laborem, quem

primus inter

eos qui aliquid posteris in medi-

cina reliquerunt subi-

ui, bene con-

sule.

Anno.

1537.

Men. Mar.

ELENCHVS SIVE INDEX

breuis eorum, quæ capitibus
singulis huius libri
continentur.

1. De capitis dolore. fo. 5.
2. De vertigine, quam Græci σκοτωμα νο-
cant. fo. 8.
3. De phrenitide. fo. 9.
4. De apoplexia. fo. 10.
5. De lethargo. fo. 11.
6. De congelatis, quibus semper oculi inconniuen-
tes manent. fo. 12.
7. De nervorum resolutione, quæ παράλυσις δι-
citur. fo. eodem.
8. De stupore & tremore. fo. 14.
9. De oris distortionem. fo. 15.
10. De conuulsione, quam σπασμὸς Græci νο-
cant. fo. eodem.
11. De morbo comitiali ἐπιληψία dicto. fo. 16.
12. De incubone, qui affectus ἐφιάλτης Græcis dici-
tur. fo. 18.
13. De melancholia. fo. 19.
14. De distillatione, raucitate, & grauedine.
folio.

ELENCHVS

15. De lippitudine, quæ ὀφθαλμία Græcis uocatur. fo. 24.
16. De oculorum ulceribus. fo. 26.
17. Ad ea quæ oculis incidunt educenda. fo. 28.
18. De albugine oculo innata. fo. eodē.
19. De scabritie & tunicula. fo. 29.
20. Ad maiorum angulorum carunculas pruritu uexatas. fo. eodē.
21. De ungui oculorum, quod τῆρνυϊον Græcis uocatur. fo. 30.
22. De uib. ce, ac cruentis suffusionibus ex ictu, aliæ ue causa. fo. 31.
23. Ad lachrymas. fo. eodē.
24. De uisus debilitate. fo. eodē.
25. Ad palpebrarum tumorem, Græcis χέμοσις apellant. fo. 32.
26. Ad palpebrarum pilos, oculos irritantes. fo. eod.
27. De suffusioe, siue humorū in oculū affluxu. fo. eod.
29. Ad nocturnam cæcitudinem, quæ νυκταλωΐ Græcis dicitur. fo. 34.
29. De dilatatione pupillæ. fo. eodem.
30. De fistulis maioribus oculi angulis accidentibus. fo. 35.
31. De aurium dolore. fo. 36.

CAPITVM.

32. De auris ulcere. fo. 37.
33. De sonitu & tinnitu aurium. fo. eod.
34. Ad grauem auditum. fo. 38.
35. Ad aurium uermes, & animalcula auditus meatus
tum irrepentia. fo. 38.
36. Ad ea quæ in meatum auditorium incidunt euellenda. fo. eod.
37. Ad sanguinem e naribus erumpentem. fo. eod.
38. Ad narium crustas & ulcera. fo. 40.
39. De polypo & sarcomate. fo. eod.
40. De oblæsa olfaciendi facultate. fo. 41.
41. De dentium & gingiuarum dolore. fo. 42.
42. Medicamenta eradicantia & confringentia dentes. fo. 43.
43. Ad refriktionem & stuporem dentium. fo. 44.
44. Ad dentes, qui frigidi cōtactu indole scūt. fo. eod.
45. De linguæ orisq; superficialijs ulceribus. fo. eod.
46. De gingiuis sanguine humentibus. fo. 45.
47. De laxatione procidentiaue gargarionis. fo. eod.
48. De hirudinibus gutturi incidentibus, aut alijs reptilibus
libus fortuito irreptantibus. fo. 46.
49. De his quæ in os, seu œsophagum prolabantur. fo. eodem.
50. Ad oblæsum linguæ sensum & motum, ac deficientem

tem

ELENCHVS

- tem motum . fo. 47.
51. Ad linguam in nimiam molem intumescen-
tem. fo. 48.
52. De tumore sub lingua enato, qui ranula dici-
tur. fo. eodē.
53. Ad pustulas ac tumores lingua. fo. eodē.
54. De angina. folio eodem.
55. De iussi. fo. 49.
56. De difficultate spirandi, quam Græci $\epsilon\delta\mu\alpha$ ap-
pellant. fo. 51.
57. De laterali dolore, qui $\pi\lambda\epsilon\upsilon\rho\acute{\iota}\tau\iota\varsigma$ Græcis dici-
tur. fo. eodē.
58. De pulmonum inflammatione, quæ $\pi\epsilon\rho\iota\pi\pi\upsilon\epsilon\upsilon\mu\omicron$
vix Græcis dicitur. fo. 53.
59. De cruentis ac purulentis exspuitionibus. fo.
lio eodem.
60. De tabe, quæ $\phi\theta\acute{\iota}\sigma\iota\varsigma$ Græcis dicitur. fo. 55.
61. De cordis palpitatione. folio eodem.
62. De cholera morbo. fo. 56.
63. De ventriculi imbecillitate. fo. 58.
64. De oris ventriculi dolore, ac inflammatione. fo.
lio 61.
65. De singultu. fo. 64.
66. De canino appetitu. fo. 65.


CAPITULUM

67. De iocinoris dolore. folio eodem.
68. De morbo regio, qui ἰκτερος Græcis dicitur. fol. 67.
69. De aqua inter cutem, quæ ὑδρωψ Græcis dicitur. fol. 68.
70. De lienis dolore. fol. 70.
71. De morbis intestini plenioris & tenuioris, hic ἰλεος, ille κώλικος Græcis dicitur. fol. 71.
72. De uentris profluvio. fol. 76.
73. De urinæ difficultate. folio. 81.
74. De renum & uesicæ calculo. fol. 83.
75. De renum & uesicæ inflammatione. fol. 85.
76. De urinæ ardore. fol. 86.
77. Ad sanguinem & pus mingentes. folio eodem.
78. De his qui inuiti urinam reddunt. folio. 87.
79. De lumbricis in ano ac uentre natis. fol. 89.
80. De hæmorrhoidibus, scissuris, & fistulis ani. folio eodem.
81. Ad procidentiam ani & uulvæ. fol. 93.
82. Ad menses confertim erumpentes. fol. 94.
83. Ad suppressos menses citandos. fol. eod.
84. De uulvæ scissuris. folio. 95.
85. De uulvæ inflammatione. fol. eodem.
86. De uulvæ strangulatione. fol. 96.

ELENCHVS CAPITVM.

87. De mola uteri. fo. 97.
 88. De ramicum generibus. fo. 98.
 89. De podagra, reliquisque articularijs morbis.
 folio . 99.
 91. Ad incipientem gibbum. fo. 103.
 92. De uaricibus. fo. 104.
 93. De elephantia. fo. eodem.
 94. De lumborum rubore, seu exulceratione.
 folio. 105.
 De doloribus extremarum, summarumue par-
 tium, fo. eodem.

FINIS.



ERRATA.

Folio. 2. pa. i. vers. 7. tijs.	6. 2. 24. species.	14. 2. 6.
hæc simul.	16. 2. comiti.	17. 2. 15. malleo.
19. aceto.	22. 1. 16. myroba.	23. 1. 9. decem.
24. 2. 16. rum, ta.	26. 2. 14. vlcis curatio.	27. 1. 11.
accommo. 31. 1. hysso.	32. 2. 3. afflux.	33. 1. 13. men.
37. 1. 1. tet) agrotantem intra	40. 10. rium	
efficacius tra.	8. 16. hypo.	2. linea. 14. in margine, Ex
pituita.	47. deglu. 49. carica.	52. αf. 53. 2. 18. strat. -I
21. 57. 18. abiici.	22. Quod si.	64. rute. 67. 1. maticum. &
26. semiss.	76. ribes.	95. Quare.
	86. syrupi.	93. collyr.

Ad reliqua leuioris momenti lector
pius facile conuiuebit.